

# POULTRYMUNE®

## AE + FP LV

NÚMERO DE REGISTRO B-2083-048

Virus vivo de Encefalomiелitis Aviar cepa Calnek y Viruela aviar, cepa homologa.

### USO VETERINARIO

#### FÓRMULA

Cada mL contiene un título mínimo de  $10^{4.0}$   $DIEP_{50\%}$  de los virus de Encefalomiелitis Aviar y Viruela Aviar.

#### INDICACIONES

**Poultrymune® AE + FP LV** es una vacuna liofilizada recomendada como auxiliar en la prevención de la enfermedad de la Encefalomiелitis Aviar, cepa Calnek y Viruela Aviar, cepa homologa.

Para administrarse a pollas de reemplazo, ponedoras y reproductoras de 10 semanas de edad o mayores, en aves sanas que no estén en producción, como auxiliar en la prevención de la Encefalomiелitis Aviar (AE) y la Viruela Aviar (FP).

#### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Aplicación por la vía punción del ala:

1. Reconstituya la vacuna con 10 mL con el diluyente estéril (el cual se vende por separado) por cada 1000 dosis de producto, esto debe realizarse unos minutos antes de su aplicación de esta manera asegurara mantener la máxima potencia de la vacuna, agite vigorosamente el producto a manera de que asegure que el liofilizado se disuelve completamente.
2. Una vez reconstituida la vacuna con el diluyente, con ayuda del aplicador que acompaña al diluyente aplique 0.01 mL vía punción en ala en cada una de las aves.

#### Reacciones post-vacunales:

1. Siete a diez días después de la vacunación, se evidencia una reacción post-vacunal en el lugar de aplicación de la vacuna, aparece una pústula pequeña de color rojizo con presencia de una costra, la cual desaparece y cae algunos días después.
2. Se sugiere verificar al menos 100 aves por caseta para verificar la presencia de la reacción post-vacunal en el pliegue del ala.
3. Las aves que no presenten la reacción post-vacunal deberán nuevamente ser revacunadas.

#### PROGRAMA DE VACUNACIÓN

El tiempo óptimo de vacunación, depende de la susceptibilidad, incidencia de la enfermedad, bioseguridad de la granja y el manejo de la parvada, por lo que se recomienda la supervisión del médico veterinario. La vacuna puede utilizarse con seguridad a partir de la semana 10 de edad o 4 semanas antes de la producción de huevo, se recomienda su aplicación cuando las aves estén clínicamente sanas. Si se requiere de mayor información consulte al Departamento Técnico de LAPISA.

#### ADVERTENCIAS

Administrar el producto sólo en animales clínicamente sanos.

LAPISA, S.A. de C.V. Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5 - Col. Camelinas - C.P. 59375. La Piedad, Michoacán, México - [www.lapisa.com](http://www.lapisa.com) - Teléfono: (352) 526 1300. Poultrymune® AE + FP LV (Encefalomiелitis Aviar y Viruela aviar), Número de registro B-2083-048. Consulte al Médico Veterinario. 240-SAN-FT-01A

No administrar el producto en aves enfermas o estresadas. Almacenar en refrigeración a una temperatura entre 2 y 7 °C. Evite la congelación y exposición directa del producto a los rayos solares.

No mezclar esta vacuna con ningún otro producto de uso veterinario.

Una vez reconstituido el producto, utilice inmediatamente todo el contenido, no conserve restos para aplicaciones posteriores.

Los recipientes vacíos, así como cualquier contenido residual deben desecharse de acuerdo a la normatividad vigente.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

#### PRESENTACIÓN

Caja con 10 frascos de 1000 dosis.

#### CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

