

# CYMOX® 10

RSCO-FUNG-0362-305-002-010  
 FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA  
 POLVO HUMECTABLE  
 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 (BANDA AZUL)

## TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR

LAPISA, S.A. DE C.V.  
 Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5  
 Col. Camelinas, C.P. 59375  
 La Piedad, Michoacán de Ocampo, México  
 Teléfonos y Fax del expedidor:  
 Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612  
 www.lapisa.com

## DATOS DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS

INGREDIENTE ACTIVO:	10%
Cymoxanil	
INGREDIENTES INERTES:	90%
Antiapelmazante, dispersante y vehículo.	
Total	100%

## MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.

El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).

En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado mas cercano.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS  
 INSTRUCCIONES DE USO  
 SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Papa (15)	Tizón Tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2 - 3 kg/ha Aplicación al follaje
Calabacita*, Calabaza*, Melón*, Pepino*, Sandía* (3)	Mildiú ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	1 - 2 kg/ha Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalo de 7 días entre cada una. Volumen de aplicación de 430-530 L de agua/ha.

( ) Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

\*Bajo condiciones de agricultura protegida.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** no entre al área tratada antes de las 24 hrs.

## MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra cuidadosamente el envase y en un tambo con agua mezcle la cantidad de producto de acuerdo a las dosis recomendadas, utilice este producto con fungicidas preventivos para complementar la acción curativa, agite hasta que quede el producto totalmente incorporado al agua, sin dejar de agitar llene con el agua faltante hasta llegar al volumen final deseado.

Para obtener buenos resultados realice una buena cobertura de cultivo calibrando su equipo de aplicación. Se recomienda hacer dos aplicaciones con intervalo entre cada una de 7 días. Se recomienda hacer las aplicaciones en la mañana y sin viento. Aplicación al follaje con volumen de agua de 430-530 L/ha.

## CONTRAINDICACIONES

No se aplique cuando el cultivo esté en condiciones de estrés como sequía, temperaturas bajas extremas, deficiencias nutricionales o cualquier otro factor que interfiera en el crecimiento del cultivo.

No usar como forraje restos de plantas tratadas con este producto. Evite aplicar cuando existan posibilidades de lluvia para evitar el lavado del producto.

## FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico si es utilizado en forma específicamente recomendada en esta etiqueta. Cuando desconozca la fitotoxicidad potencial deberá hacerse una pequeña prueba previa a su aplicación para evitar efectos indeseables.

## INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con plaguicidas surfactantes y/o fertilizantes sin pruebas previas que demuestren compatibilidad. Mezclar sólo con productos autorizados por la COFEPRIS.

## MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes



mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

#### **GARANTÍA**

**LAPISA S.A. DE C.V.** garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

#### **LAPISA S.A. DE C.V.**

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375.

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México

Teléfonos y Fax del expedidor:

Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612.

[www.lapisa.com](http://www.lapisa.com)

