

Número de registro Q-2083-128 Sulfóxido de albendazol y closantel sódico en suspensión oral USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada mL contiene:	
Sulfóxido de albendazol	30 mg
Closantel	150 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

VERMES PULMONARES	VERMES GASTROINTESTINALES	TENIAS	TREMÁTODOS	MIASIS
Dictyocaulus spp. (Gusano pulmonar grande) Protostrongylus spp. Muellerius capillaris. (Gusanos pulmonares pequeños)	Haemonchus spp. (Gusano grande del cuajo) Trichostrongylus spp. (Gusano de la diarrea negra) Nematodirus spp. (Gusano del cuello delgado) Chabertia ovina (Gusano de boca grande) Ostertagia spp (Gusano café del estómago) Strongyloides spp., Cooperia spp. (Gusano fino del intestino) Bunostomum spp. (Gusano en forma de Gancho) Neoascaris vitulorum (Lombriz grande)	Moniezia spp. (Gusano plano)	Fasciola hepatica (Gusano plano del hígado)	Oestrus ovis. (Gusano de la nariz)

INDICACIONES:

Antihelmíntico oral de amplio espectro para uso en bovinos (engorda y productores de leche) y ovinos, actúa contra formas inmaduras, adultas y huevos de nemátodos gastrointestinales, pulmonares, céstodos, tremátodos y miasis de Oestrus ovis (gusano de la nariz).

DOSIS:

1 mL por cada 20 kg de peso corporal, equivalente a 30 mg de Sulfóxido de albendazol y 150 mg de Closantel por cada 20 kg de peso corporal.

Aplicar con base en un análisis coproparasitoscópico, se recomienda el uso a intervalos de 2 meses con un máximo de 4 veces al año.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

PERIODO DE RETIRO:

No utilizar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 28 días

posteriores al tratamiento.

No utilizar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 28 días posteriores al tratamiento.

PRESENTACIONES:

Garrafa con 5 L

ADVERTENCIAS:

Agítese antes de usarse.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Almacenar en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre 15 y 30 °C.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Closalben-F® es un antihelmíntico muy activo que, por su poca solubilidad, permanece largos periodos como precipitado sólido en el intestino, a medida que se disuelve lentamente mantiene concentraciones en plasma e intestino por largo tiempo, facilitando su acción sobre larvas inmaduras y latentes (hipobióticas), así como en parásitos adultos.

FICHA TÉCNICA







Por consecuencia los efectos curativos de **Closalben-F**® se traducen en una rápida recuperación de los animales tratados, reduciéndose los signos clínicos, (pelo hirsuto, edematosos, diarrea, cólicos y tos).

Closalben-F® no influye negativamente en la fertilidad, lo cual permite administrarlo en cualquier etapa de la gestación sin peligro alguno.



131-SAN-FT-01A

FICHA TÉCNICA



.





CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA