



DULKO SC®

RSCO-INAC-101A-0531-064-20.12
INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN ACUOSA CONCENTRADA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 (BANDA AZUL)

TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR

LAPISA, S.A. DE C.V.
Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5
Col. Camelinas, C.P. 59375
La Piedad, Michoacán de Ocampo, México
Teléfonos y Fax del expedidor:
Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612
www.lapisa.com

DATOS DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS

INGREDIENTE ACTIVO:	20.12%
Fipronil	
INGREDIENTES INERTES:	79.88%
Viscosante, antioxidante, diluyente, surfactante, dispersante, conservador, colorante, anticongelante, vehículo	
Total	100%

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la Semarnat.

El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).

En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado mas cercano.

Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el deposito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

Este producto es altamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente (aves).

Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces,

invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas).

Este producto es altamente tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Este producto es un insecticida del grupo de los fenilpirazoles, formulado como suspensión acuosa concentrada que actúa por contacto e ingestión, de aplicación foliar.

Se recomienda en el cultivo y contra la plaga que se indica:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Trigo, Triticale (SL)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga vetula</i>)	800-1000 mL/ha Realizar la aplicación en banda, directamente a la semilla antes de ser cubierta al momento de la siembra. Volumen de aplicación 150-250 L/ha
Crisantemo (SL)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	30-40 mL/200 L de agua Realizar dos aplicaciones con intervalo de 7 días entre cada una Volumen de aplicación 400 L/ha.
Papa (45)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga obsoleta</i>)	800 - 1000 mL/ha Realizar una aplicación dirigida al fondo del surco al momento de la siembra. Volumen de aplicación: 160-260 L/ha.

() Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: no entre al área tratada antes de las 3 hrs.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de abrir, revise que el envase este debidamente cerrado. Agite bien el producto antes de abrir el envase. Proceda a retirar el sello de seguridad y con la ayuda de una probeta proceda a medir la cantidad de producto que va a aplicar. Mezcle el producto con agua en un envase por separado, posteriormente agite y proceda a vaciar su contenido en el tanque de aplicación continuando su agitación.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35°C.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico si es utilizado en forma específicamente recomendada en ésta etiqueta. Cuando se desconozca la fitotoxicidad potencial, debera hacerse una pequeña prueba previa a su aplicación para evitar efectos indeseables.



Lapisa
AGRÍCOLA
¡Cosechando resultados!

INCOMPATIBILIDAD

Este producto debe ser aplicado solo.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

GARANTÍA

LAPISA S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

LAPISA S.A. DE C.V.

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375.

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México

Teléfonos y Fax del expedidor:

Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612.

www.lapisa.com

