

Dectiver Premium®

Número de registro Q-2083-131

Ivermectina inyectable.

USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada ml contiene:	
Ivermectina	31.5 mg
Vehículo c.b.p.	1.0 mL

DESCRIPCIÓN:

Solución estéril inyectable de Ivermectina al 3.15% lista para usarse. Presenta una absorción lenta y alta biodisponibilidad en proteínas plasmáticas, hígado y tejido adiposo, lo que permite un efecto terapéutico prolongado.

Indicado para el tratamiento y control de adultos y larvas de cuarto estadio (L4) de nemátodos gastrointestinales y pulmonares además de la garrapata *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, ácaros y piojos chupadores. Auxiliar en el control de los parásitos externos como ácaros causantes de la sarna coriográfica y piojos masticadores de bovinos en pastoreo o estabulados.

La formulación de este producto proporciona al poco tiempo de aplicación, un nivel máximo de concentración, alcanzando valores aceptables de duración en plasma, permitiendo la liberación lenta y sostenida de la ivermectina favoreciendo una acción terapéutica, eficaz y prolongada a pesar de la sobrevivencia prolongada de los parásitos en el ambiente (efecto profiláctico).

MODO DE ACCIÓN:

Dectiver® Premium, proporciona el tratamiento y control de las infestaciones causadas por los siguientes parásitos de los bovinos y también previene la reinfestación por el periodo de tiempo que se indica.

Parásitos internos:

Nemátodos gastrointestinales (adultos y L4) *Haemonchus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Cooperia spp.*, *Mecistocirrus spp.*,

Nematodirus spp., *Oesophagostomum spp.*, *Ostertagia spp.*, *Strongyloides spp.*, *Trichostrongylus spp.*, (7 semanas).

Nemátodos pulmonares (adultos y L4) *Dyctiocaulus spp.* (9 semanas).

Parásitos internos:

Garrapata del bovino *Boophilus microplus* (80 días).

Larvas de moscas: *Dermatobia hominis* (140 días).

Piojos chupadores: *Haematopinus eurysternus*, *Lynognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*.

Ácaros: *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes scabiei var. bovis* (56 días).

Miasis: *Cochliomyia hominivorax*.

Auxiliar en el control de parásitos externos:

Piojo masticador: *Damalinea bovis*.


Acaro de la sarna: *Chorioptes bovis*.

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

La dosis recomendada de **Dectiver® Premium** es de 630 µg por kilogramo de peso corporal. La solución al 3.15% se aplica a razón de 1 ml por 50 kg de peso corporal; se debe administrar únicamente por vía subcutánea. Se recomienda en bovinos en pastoreo y estabulados siempre y cuando la administración del producto sea antes de los 122 días para ser destinados a consumo humano.

ADMINISTRACIÓN:

La única vía recomendada de administración es la vía subcutánea a nivel del cuello o por delante o detrás de la paleta. **Dectiver® Premium** puede ser administrado con una jeringa de tipo automática o convencional, utilizando



ESPECIE:



una aguja estéril calibre 16 de 15 a 20 mm de largo.

SEGURIDAD:


Dectiver®Premium presenta un amplio margen de seguridad. A la dosis recomendada no se han observado efectos secundarios o adversos en los animales jóvenes, adultos, hembras gestantes o en su comportamiento reproductivo.

PRESENTACIONES:


Frasco con 500 mL.

ADVERTENCIAS:

- No se administre este producto a bovinos en producción láctea para consumo humano.
- No consumir la carne de los animales tratados hasta 122 días después de la última aplicación.
- No se debe aplicar por vía intramuscular o intravenosa.
- Debido a la toxicidad que representa la ivermectina a los organismos acuáticos, los envases y sus residuos deben desecharse en forma segura, enterrándolos y/o incinerándolos.
- Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



090-SAN-FT-01A



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ESPECIE:

