


# Diaphos®

RSCO-MEZC-PEC-0120-0115-X0003-373-40.0

## Aretes insecticidas

Lapisa®



ESPECIE:



### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTES ACTIVOS	% EN PESO
<b>Diazinon</b> .....	30.00%
0,0-dietil 0-2-isopropil-6-metilpirimidin-4-il fosforotioato (Equivalente a 300 g de i.a./kg)	
<b>Clorpirifos</b> .....	10.00%
0,0-dietil 0-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato (Equivalente a 100 g de i.a./kg)	
INGREDIENTES INERTES:.....	60.00%
Vehículo/Plastificante, Pigmentos, Tinta/Pigmentada, Anticuaajante.	
TOTAL.....	100.00%

### DESCRIPCIÓN

**Diaphos®** es el único arete mosquicida en México, que libera una formulación sinérgica de Diazinon 30% y Clorpirifos 10% de una matriz de tres polímeros exclusivos con ingredientes inertes no tóxicos. Su formulación patentada exhibe una mayor potencia que cualquiera de los insecticidas usados de forma individual y es especialmente efectivo contra moscas resistentes a insecticidas piretroides y a Diazinon. **Diaphos®** tiene un peso neto de 15 g por arete para una eficacia de larga acción.

### USO RECOMENDADO

- En ganado de carne, para controlar la mosca de cuerno *Haematobia irritans* (incluyendo poblaciones resistentes a piretroides y a Diazinon).
- Para el control adecuado de la mosca del cuerno, usar un arete por animal, el cual brinda una protección de 3.5 meses.
- Se recomienda retirar el arete, una vez pasado el período de acción (3.5 meses).
- Para uso en ganado de carne y ganado lechero fuera de producción.
- **Diaphos®**, ha sido evaluado en campo, demostrando su eficacia contra poblaciones de mosca del cuerno resistentes a piretroides y a Diazinon hasta por 3.5 meses.
- No se recomienda aretar becerros menores de tres meses de edad.

### ADVERTENCIAS

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forraje.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.

- No use el producto sin el equipo de protección adecuado.
- Lávese las manos después de utilizar el producto antes de consumir alimentos.
- No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel.
- Use guantes de hule para manipular los aretes.
- En caso de intoxicación lleve al paciente con el médico y muéstrele la etiqueta.

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**Grupo químico:** Organofosfatos.

**Antídoto y tratamiento:** Si se presentan síntomas de inhibición de la colinesterasa, el sulfato de atropina inyectado es un antídoto.

**Signos y Síntomas de intoxicación:**

**Vía oral:** visión borrosa, debilidad, náuseas, calambres, diarrea, dolor en el pecho, nerviosismo, sudoración, pupilas contraídas, lagrimeo y salivación. **Vía dermal:** irritación de piel. **Vía inhalatoria:** dolor de cabeza, mareo produce, secreción excesiva de flujo mucoso de los bronquios, dificultad para respirar, dolor torácico, broncoconstricción.

### PRESENTACIÓN

**Diaphos®** está disponible en cajas con 20 aretes y paquete ganadero de 100 aretes (5 bolsas de 20 aretes cada uno). Cada arete incluye un botón macho.



### USO VETERINARIO.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

LAPISA, S.A. de C.V. Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5, Col. Camelinas, C.P. 59375, La Piedad, Michoacán, México. Tel. +52 (352) 5261300.  
www.lapisa.com. **Diaphos®** (Diazinon, Clorpirifos) Número de Registro RSCO-MEZC-PEC-0120-0115-X0003-373-40.0.

Consulte al Médico Veterinario. 210-AGR-FT-01A