

# Diramox® L.A.

Número de registro Q-2083-085

Suspensión inyectable.

USO VETERINARIO

FICHA TÉCNICA

## FÓRMULA:

Cada mL contiene:	
Amoxicilina	150 mg
(Como amoxicilina trihidratada 172.1 mg)	
Vehículo c.b.p.	1 mL

## INDICACIONES:

**Diramox® L.A.** está indicado en el tratamiento de las infecciones causadas por una gran variedad de bacterias Gram negativas y Gram positivas que afectan las vías respiratorias, tracto digestivo, piel, tracto urogenital en bovinos de carne y leche, ovinos, caprinos y porcinos.

## DESCRIPCIÓN:

Antibiótico semisintético de amplio espectro análogo de la ampicilina, perteneciente al grupo de los betalactámicos.

## MECANISMO DE ACCIÓN:

La Amoxicilina es absorbida rápidamente después de haber sido inyectada y se difunde en la mayoría de los tejidos y fluidos orgánicos.

Los betalactámicos son antibióticos con efecto bactericida que destruyen la pared de las células bacterianas debido a que se unen a una variedad de proteínas responsables de la síntesis de dicha pared. La interferencia con tales proteínas resulta en muerte y lisis de las bacterias. La Amoxicilina, posee algunas ventajas que la hacen diferente a otras penicilinas: -Actividad contra gérmenes Gram negativos como *E. coli*, *Salmonella* y *Proteus*. -Actividad contra *Pseudomona aeruginosa*.

## ESPECTRO DE ACCIÓN:

### Gram negativos

*Pasteurella spp*  
*Brucella spp*  
*Fusobacterium spp*  
*Fusiformis spp*  
*Haemophilus spp*  
*Salmonella spp*  
*Moraxella spp*  
*Bordetella spp*  
*Escherichia coli*  
*Proteus spp*  
*Klebsiella pneumoniae*

### Gram positivos

*Bacillus anthracis*  
*Erysipelothrix spp*  
*Staphylococcus aureus*  
*Clostridium spp*  
*Streptococcus suis*  
*Corynebacterium spp*

## DOSIS:

Para bovinos de carne y leche, ovinos, caprinos y porcinos: 15 mg/kg de peso (1 mL por cada 10 kg).

Si es necesario se puede repetir la dosis a las 48 horas.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos de carne y leche, ovinos, caprinos y porcinos: Intramuscular.

## PERIODO DE RETIRO:

No utilizar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 25 días posteriores al tratamiento.

La leche de los animales tratados deberá consumirse 96 horas después de la última aplicación del producto.

## Presentación:

Frasco con 100 mL.





ESPECIE:



**ADVERTENCIAS:**

No se administre en animales con antecedentes alérgicos a la penicilina.  
 Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.  
 Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



075-SAN-FF-01B

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ESPECIE:

