



Fulgenol®

Eugenol, Ácidos Fúlvicos
RSCO-MEZC-FUNG-0940K-X0126-009-17.46

Fulgenol® es un fungicida agrícola formulado a base de Eugenol y Ácidos Fúlvicos, diseñado para el manejo de enfermedades causadas por hongos de importancia agrícola, especialmente en aplicaciones dirigidas al suelo y mediante drench. Su formulación combina acción botánica y acondicionamiento fisiológico de la planta, ayudando a mantener cultivos más sanos y vigorosos.

COMPOSICIÓN	% EN PESO
Ingrediente Activo: Eugenol 2-metoxi-4-(prop-2-en-1-il)fenol [Extracto de clavo (<i>Syzygium aromaticum</i>)] (Equivalente a 130.5 de i.a/L a 20° C)	12.62
Ácidos fúlvicos Ácido 3,7,8-trihidroxi-3-metil-10-oxo-1,4-dihidropirano[4,3-b]cromeno-9-carboxílico (Equivalente a 50.0 g/L a 20° C)	4.84
Ingredientes inertes: Emulsificantes, Solvente	82.54
Total	100.00

MECANISMO DE ACCIÓN

Fulgenol® actúa mediante la acción del Eugenol, compuesto de origen botánico con actividad fungicida, el cual interfiere en el desarrollo y proliferación de hongos fitopatógenos.

La incorporación de Ácidos Fúlvicos favorece la movilidad y disponibilidad de compuestos activos en la zona radicular, promoviendo además una mejor condición fisiológica del cultivo.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Fulgenol® puede aplicarse mediante tratamientos dirigidos al suelo y mediante drench.

Antes de la aplicación:

- Calibre correctamente el equipo de aplicación.
- Utilice equipo de protección personal adecuado.

Preparación:

- Abra el envase cuidadosamente y mida la dosis requerida con ayuda de una probeta.
- Llene parcialmente el tanque con agua limpia.
- Mezcle previamente el producto en un recipiente por separado.
- Agite perfectamente.
- Vacíe la mezcla al tanque de aplicación manteniendo la agitación constante.
- Durante la aplicación:
 - Asegure una buena cobertura al pie de cada planta.
 - Utilice dosis bajas en infestaciones ligeras y dosis altas en presiones severas.
 - Evite aplicaciones bajo calor intenso, vientos mayores a 15 km/h o probabilidad de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar **Fulgenol®** con otros plaguicidas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Arándano Frambuesa Fresa Grosella Kiwi Vid Zarzamora (SL)	Marchitez (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0.75 - 2.0 L/ha	Realizar dos aplicaciones in drench, cuando se detecte la presencia de la enfermedad y las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo; volumen de aplicación sugerido 1000 L de agua/ha.
Aguacate (SL)	Marchitez (<i>Fusarium oxysporum</i>) Tristeza del aguacatero (<i>Phytophthora cinnamomi</i>)	0.75 - 2.0 L/ha	Realizar dos aplicaciones in drench, cuando se presente la presencia de la enfermedad y las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo; volumen de aplicación 2160 L de agua/ha

Lapisa S.A. de C.V.

Carretera La Piedad - Guadalajara km 5.5,

Col. Camelinas, C.P. 59375

La Piedad, Michoacán, México.

01 (352) 52 6 13 00

www.lapisa.com