

# GREENSEKT® 50 WG

RSCO-INAC-0102F-X0364-034-50.0

INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES

Categoría Toxicológica 4 PRECAUCIÓN (banda azul)

## TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México

Teléfonos y Fax del expedidor:

Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612

www.lapisa.com

## DATOS DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS

INGREDIENTE ACTIVO:	50%
Pimetrozina	
INGREDIENTES INERTES:	50%
Estabilizador, Humectante, Dispersante, Antiespumante y Diluyente.	
Total	100%

## MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.

El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).

En caso de caída accidental del producto, deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y los demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizados más cercano.

Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS  
INSTRUCCIONES DE USO  
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Brócoli, Col, Coliflor (7)	Pulgón cenizo ( <i>Brevicoryne brassicae</i> )	100-400 Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 307-407 L de agua/ha.
Pepino, Calabacita, Chayote, Melón, Sandía (SL)	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	500-600 Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 440-540 L de agua/ha.
Nogal (14)	Pulgón amarillo ( <i>Monellia caryella</i> )	500-700 Realizar una aplicación foliar cuando se tenga la presencia de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 258-358 L de agua/ha.
Jitomate, Berinjena, Chile, Papa (SL)	Paratrioza ( <i>Bactericera cockerelli</i> )	750-850 Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se tenga la presencia de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 433 - 533 L de agua/ha.
Papayo (1)	Mosca blanca ( <i>Trialeurodes variabilis</i> )	400-600 Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 950-1050 L de agua/ha.

( ) Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin Límite

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** no entre al área tratada antes de las 12 hrs.

## MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de abrir, revise que el envase esté debidamente cerrado. Con el equipo de protección indicado en la parte izquierda de esta etiqueta, proceda a retirar el sello de seguridad con ayuda de unas tijeras y en seguida gire la tapa del envase en sentido contrario de las manecillas del reloj.

Posteriormente, con ayuda de una báscula proceda a pesar la cantidad de producto que va a aplicar de acuerdo con las dosis recomendadas. Mezcle el producto en un tambo con agua y agite hasta que el producto quede totalmente incorporado y sin dejar de agitar agregue el agua necesaria para llegar al volumen final deseado.

Para obtener mejores resultados realice una cobertura adecuada del cultivo calibrando su equipo de aplicación.

## CONTRAINDICACIONES

No se aplique en cultivos para los que no tiene recomendación de uso en esta etiqueta.

No se aplique cuando el cultivo esté en condiciones de estrés como sequía, temperaturas bajas extremas, deficiencias nutricionales, o cualquier otro factor que interfiera en el

crecimiento del cultivo.

No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35°C o cuando haya posibilidades de lluvia. No usar como forraje restos de plantas tratadas con este producto.

#### **FITOTOXICIDAD**

Este producto no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados si es aplicada a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

Cuando desconozca la fitotoxicidad potencial deberá hacerse una pequeña prueba previa a su aplicación para evitar efectos indeseables.

#### **INCOMPATIBILIDAD**

Este producto es compatible con insecticidas a base de Imidacloprid en presentación suspensión concentrada; a base de Cyromazina en presentación polvo soluble y a base de Lambda Cyhalotrina en presentación concentrado emulsionable. Fungicidas a base de Azoxystrobin en presentación gránulos dispersables. Bactericidas a base de Sulfato de Gentamicina, Oxitetraciclina y Sulfato de Cobre en presentación polvo humectable. También es compatible con fertilizantes foliares a base de macro y microelementos en presentaciones líquidas y de cristales solubles, así como, con reguladores de crecimiento a base de fitohormonas biológicamente activas en presentación líquida y ácidos húmicos en presentación líquida.

#### **MANEJO DE RESISTENCIA**

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

#### **GARANTÍA**

**LAPISA S.A. DE C.V.** garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

#### **LAPISA S.A. DE C.V.**

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375.

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México

Teléfonos y Fax del expedidor:

Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612.

[www.lapisa.com](http://www.lapisa.com)

