



ECTOPARASITICIDA EN SOLUCIÓN TÓPICA
NÚMERO DE REGISTRO: Q-2083-213
USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Fluazurón	25 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

INDICACIONES:

Antiparasitario externo

IxoShield[®] es un inhibidor del desarrollo de las garrapatas de acción sistémica para el control estratégico de la garrapata *Rhipicephalus microplus* en bovinos de carne de engorda y cría. El uso de Fluazurón, aplicando el producto 3 o 4 veces al año, interrumpe el ciclo biológico de las garrapatas, ayudando a controlar su población en animales y potreros.

Fluazurón es un derivado de las benzoilfenilureas, que actúa inhibiendo la síntesis de quitina y, en consecuencia, impide el desarrollo de las diferentes etapas parasitarias de las garrapatas, disminuyendo la población en los potreros.

Actúa de forma sistémica, después de la aplicación en el dorso del animal, penetra al flujo sanguíneo y permanece activo durante semanas, interfiriendo en la síntesis de quitina, elemento principal del exoesqueleto de las garrapatas. Al ingerir Fluazurón a través de la sangre del bovino tratado, las garrapatas en el estadio de larva y ninfa mueren al no poder mudar al siguiente estadio. En las hembras que logran completar su repleción de sangre con Fluazurón, este tendrá un efecto transovárico impidiendo la eclosión larval.

ESPECIE:

Bovinos de carne de engorda y cría.

DOSIS:

Administrar 5 mL del producto por cada 50 kg de peso corporal (equivalente a 2.5 mg de Fluazurón por kg de peso corporal). En ganado de carne en engorda, el control de la garrapata se obtiene con una dosis única. En ganado de carne de cría en pastoreo, se recomienda un tratamiento estratégico a los 3 o 6 meses en un programa de control integrado, considerando la temporada del año y nivel de infestación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica, esparciendo el producto en dos líneas paralelas, a cada lado de la columna, desde la cruz hacia la base de la cola. Es absorbido a través de la piel y por la vía oral cuando los animales se lamen, permitiendo que el activo llegue al torrente sanguíneo y establezca un equilibrio a doble vía entre este y el tejido adiposo, donde se deposita, manteniendo una concentración del activo por un tiempo prolongado.

PERIODO DE RETIRO:

Lo animales destinados para consumo humano deben sacrificarse 42 días después de finalizado el tratamiento.

ADVERTENCIAS:

No administrar el producto en bovinos productores de leche para consumo humano. No sacrificar terneros destinados para consumo humano, menores a 1 año que estén siendo amamantados por vacas

ESPECIE:



tratadas con Fluazurón. Utilice guantes protectores durante la aplicación de producto. Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre 15 y 30 ° C. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Los recipientes vacíos, así como cualquier contenido residual deben desecharse de acuerdo con la normatividad vigente / Eliminar los envases en el centro de acopio temporal más cercano.

PRESENTACIÓN:

Envase de 1 y 5 L.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO

Hecho en México por:
LAPISA, S. A. DE C. V.
Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,
Col. Camelinas, C. P. 59375,
La Piedad Michoacán, México.
Tel + 52(352) 526-13-00
www.lapisa.com

214-SAN-FT-01A

