



NÚMERO DE AUTORIZACIÓN A-2083-159

Premezcla a base de Clorhidrato de Zilpaterol y Cromo para bovinos de engorda
USO VETERINARIO

ANÁLISIS GARANTIZADO:

CALCIO.....12.50% MIN
CENIZAS.....80.00% MAX
HUMEDAD.....10% MAX

INGREDIENTES:

Cascarilla de arroz, olote de maíz, Clorhidrato de Zilpaterol 7,500 g/t, Carbonato de calcio, Propionato de cromo, aceite mineral y aceite de soya.

INDICACIONES:

MAXI-RACE está indicado para mejorar el grado de rendimiento de la canal, disminuyendo el depósito de grasa, incrementa la ganancia de peso, mejora la conversión alimenticia en bovinos de engorda.

DOSIS:

Agregar 800 g de **MAXI-RACE** por tonelada de alimento terminado (con un contenido de 90% de materia seca), cada 24 horas durante los últimos 30 días de la engorda en corral. Lo cual corresponde a una concentración en el alimento terminado de 6 ppm para un animal con un peso promedio de 400 kg que consume aproximadamente 10 kg de alimento terminado (con un contenido de 90% de materia seca), esto equivale a administrar 0.15 mg de Clorhidrato de Zilpaterol por kg de peso vivo por día.

Recomendación: es importante tener en cuenta el consumo diario de alimento del animal y su peso vivo para una correcta dosificación, la cual deberá garantizar 0.15 mg por kg de peso vivo por día de Clorhidrato de Zilpaterol, como se menciona en el siguiente ejemplo:

MAXI-RACE/ tonelada alimento terminado	Peso vivo del animal	Consumo Diario	Clorhidrato de Zilpaterol
1 kg	500 kg	10 kg	0.15 mg/kg de peso vivo por día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado con el alimento terminado.

PERIODO DE RETIRO:

No deberá usar este producto 72 horas antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.



ADVERTENCIAS:

La dosificación debe hacerse con exactitud para respetar la dosis recomendada. No exceder una dosis superior a 90 mg de Zilpaterol/cabeza/día.

No se utilice en animales destinados para reproducción.

El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco a temperatura de entre 15 y 30 °C.

Para el manejo de MAXI-RACE siga las recomendaciones para la elaboración de premezcla: utilice mascarilla con filtro, guantes, lentes protectores y overol. En caso de contacto con la piel, enjuague con abundante agua corriente. Evite la inhalación directa del producto y contacto directo con la piel y ojos.

No fume ni consuma alimentos durante su manejo.

En caso de ingestión accidental, puede administrarse un bloqueador $\beta 2$ como el propranolol, bajo estricta supervisión médica.

Almacénese lejos de los alimentos y manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Deseche los envases en el centro de acopio más cercano.

Material para el uso del médico veterinario.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO**

Hecho en México por:

LAPISA, S. A. DE C. V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,

Col. Camelinas, C. P. 59375,

La Piedad Michoacán, México.

Tel + 52(352) 526-13-00

www.lapisa.com

312-SAN-FT-01A

