

# Minoxel Plus

Suspensión Inyectable  
Número de Registro Q-2083-073  
USO VETERINARIO

## FÓRMULA:

Cada mL contiene:  
Ceftiofur 50 mg  
(Equivalente a 53 mg  
de Clorhidrato de Ceftiofur)  
Vehículo c.b.p. 1mL

## DESCRIPCIÓN:

Antibiótico (Cefalosporina de tercera generación)  
**Minoxel Plus** contiene Ceftiofur clorhidrato, un antibiótico de amplio espectro perteneciente a la familia de las cefalosporinas. Es activo contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo variedades productoras de  $\beta$ -lactamasa. Como otras cefalosporinas, el Ceftiofur es bactericida como resultado de la inhibición de la síntesis de la pared celular.

## MICROBIOLOGÍA CLÍNICA:

**Perros y gatos:** En infecciones urinarias causadas por *E. coli* y *Proteus mirabilis*.

## INDICACIONES:

**Perros y gatos:** **Minoxel Plus** está indicado en el tratamiento infecciones respiratorias, de la piel y urinarias causadas por *E. coli*, *Proteus mirabilis* y otro tipo de infecciones.

## DOSIS:

**Perros y gatos:** 2 mg/kg de ceftiofur por kg de peso corporal, equivalente 0.1 mL por cada 2.5 kg de peso corporal.

El tratamiento debe ser repetido cada 24 horas por un total de 3 días.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.

## ADVERTENCIAS:

Las penicilinas y cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad en humanos (alergias) por medio de inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. La hipersensibilidad a las penicilinas puede causar sensibilidad cruzada a las cefalosporinas y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser serias. Por lo tanto:

1. No maneje este producto si usted sabe que está sensibilizado o si se le ha aconsejado no trabajar con este tipo de productos.

2. Maneje este producto con gran cuidado, tomando todas las precauciones para evitar entrar en contacto con el mismo.

3. Si después de una exposición al producto usted comienza a presentar signos tales como prurito en la piel, debe de buscar atención médica inmediata y mostrar al doctor esta advertencia.

La inflamación de la cara, labios y ojos, o la dificultad para respirar constituyen signos más serios que requieren atención médica urgente.

No administrar en animales con hipersensibilidad a las cefalosporinas u otros antibióticos beta-láctámicos.

Los pacientes con insuficiencia renal necesitan un ajuste de dosis.

Agite bien el producto antes de usarlo.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar, a una temperatura entre 15 y 30 °C.

El producto se debe utilizar de inmediato una vez abierto, cualquier sobrante no utilizado se debe desechar.

Los recipientes vacíos, así como cualquier contenido residual deben desecharse de acuerdo a la normatividad vigente / Eliminar los envases en el centro de acopio más cercano.

Hecho en México por:

**LAPISA, S.A. de C.V.**



Carr. La Piedad-Guadalajara km 5.5,

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel: +52 (352) 5261300.

[www.lapisa.com](http://www.lapisa.com)



PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA