

PREDANIL® PRO

RSCO-MEZC-INAC-1150-0386-0339-X0220-088-63.54

INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 (BANDA AZUL)

TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México

Teléfonos y Fax del expedidor:

Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612

www.lapisa.com

DATOS DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS

Ingrediente activo: % en Peso

Fipronil: 11.87

5-amino-1-(2,6-dicloro-a,a,a-trifluoro-p-tolil)

-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo.

(Equivalente a 140 g de i.a./L a 20°C)

Imidacloprid: 17.81

(E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin

-2-ilideneamina

(Equivalente a 210g i.a./L a 20°C)

Azoxystrobin: 4.24

metil(E)-2-{2-[6(2-cianofenoxi)pirimidin-4-

iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato.

(Equivalente a 50 g i.a./L a 20°C)

Tiabendazol: 2.54

2-(tiazol-4-il)benzimidazol

(Equivalente a 30 g i.a./L a 20°C)

Ingredientes inertes: 63.54

Anticongelante, Modificador reológico, Preservador,

Antiespumante, Dispersante, Humectante, Adherente

y Solvente.

Total 100.0

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.”

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS

AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Maíz (SL)	Damping off (<i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp.) Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.) Gusano de Alambre (<i>Agriotes</i> sp)	80-150 mL/90000 semillas/ha Realizar una aplicación por el método slurry al momento de la siembra. Volumen de aplicación sugerido 45-60 mL de agua/90,000 semillas.
Trigo, Triticale, Avena, Cebada, Centeno, Arroz (SL)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.) Damping off (<i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)	75 - 125 mL/200 kg de semilla/ha Realizar una aplicación por el método slurry (tratamiento a la semilla) al momento de la siembra del cultivo. Volumen de aplicación sugerido 50 - 100 mL de agua / tratamiento por volumen de semilla tratada.
Frijol, Garbanzo, Haba, Chicharo (SL)	Damping off (<i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp.) Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.) Gusano de Alambre (<i>Agriotes</i> spp)	75-125 mL/80 kg semilla/ha Realizar una aplicación por el método slurry al momento de la siembra. Volumen de aplicación sugerido 50-100 mL agua/80 kg de semilla.
Soya, Lenteja (SL)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.) Gusano de Alambre (<i>Agriotes</i> spp) Damping off (<i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)	75-125 mL/40-50 kg semillas/ha Realizar una aplicación por el método slurry (tratamiento a la semilla) al momento de la siembra del cultivo. Volumen de aplicación sugerido 50-100 mL de agua/tratamiento por volumen de semilla tratada.

() Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:

No aplica por ser tratamiento a semilla.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de abrir, revise que el envase esté debidamente cerrado y agite bien el producto. Proceda a retirar el sello de seguridad con ayuda de unas tijeras y posteriormente gire la tapa del envase en sentido contrario a las manecillas del reloj. Con la ayuda de una probeta proceda a medir la cantidad de producto que va a aplicar, proceda a vaciarlo al contenedor previamente llenado con el volumen de agua a utilizar para su aplicación, agité y proceda a aplicarlo a la semilla directamente a través del método de slurry.

CONTRAINDICACIONES

No tratar mayor cantidad de semilla que la necesaria para la siembra.

La semilla tratada deberá etiquetarse con la siguiente leyenda: ESTA SEMILLA HA SIDO TRATADA CON PREDANIL PRO NO USARSE COMO ALIMENTO, FORRAJE O PRODUCCIÓN DE ACEITE.

INCOMPATIBILIDAD

A fin de obtener un buen éxito en el tratamiento de la semilla, es importante considerar factores como una buena cobertura y mayor adherencia, por lo cual se recomienda NO realizar mezclas con otros productos fitosanitarios al momento de tratar la semilla con este producto, esto a su vez, reducirá el riesgo de fitotoxicidad a la semilla.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA

LAPISA S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

LAPISA S.A. DE C.V.

LAPISA, S.A. DE C.V.
Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5
Col. Camelinas, C.P. 59375.
La Piedad, Michoacán de Ocampo, México
Teléfonos y Fax del expedidor:
Fax: (352) 690 2001 ext. 607 y 612.
www.lapisa.com

