



**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS
AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

RASGADOR®

RSCO-MEZZC-INAC-0102M-0101U-X0219-003-25.0

INSECTICIDA

Polvo soluble

Categoría toxicológica 4 (Banda azul)

TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,

Col. Camelinas, C.P. 59375.

La Piedad, Michoacán de Ocampo, México

Teléfonos: 352 526 1300 y 352 690 2001

DATOS DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS

INGREDIENTES ACTIVOS:

Benzoato de emamectina: **5.0 %**

Mezcla de Emamectina B1a y Emamectina B1b

(con un contenido de no más del 85% de

Emamectina B1a y no más del 10% de

Emamectina B1b) (Equivalente a 50 g i.a./kg)

Acetamiprid: **20.0 %**

(E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-

metilacetamida (Equivalente a 200 g i.a./kg)

Ingredientes inertes: **75.0 %**

Humectante, Dispersante, Antiaglomerante, Diluyente

Total **100.0 %**

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha
Brócoli, Col Coliflor, Colinabo, Col de Bruselas, Mostaza Colza (7)	Palomilla Dorso de Diamante (<i>Plutella xylostella</i>) Pulgón cenizo (<i>Brevicorine brassicae</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	200 - 300 g/ha Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando aparezcan los primeros individuos. Volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.
Jitomate (Tomate rojo), Chile, Pimiento, Tomate de Cáscara, Berenjena, Okra (7)	Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>)	250 - 350 g/ha Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando aparezcan los primeros individuos. Volumen de aplicación sugerido 800 L de agua/ha.
Manzana, Pera (14)	Palomilla de la manzana (<i>Cidya pomonella</i>) Pulgón verde del manzano (<i>Aphis pomi</i>) Pulgón lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	250 - 350 g/ha Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, en el momento de la oviposición o eclosión de huevoecillos justo antes de que ocurra la penetración de las larvas del primer instar en los frutos cuajados y cuando se presenten los primeros individuos. Volumen de aplicación sugerido 1000 L de agua/ha.
Pepino, Melón, Sandía, Calabacita, Calabaza, Chayote (3)	Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp.</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>)	300 - 400 g/ha Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando aparezcan los primeros individuos. Volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.
Rosal, Azalea, Begonia, Clavel, Crisantemo, Dalia, Gardenia, Geranio, Gerbera, Gladiola, Jacinto, Nochebuena, Tulipán (SL)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>)	250 - 350 g/ha Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando aparezcan los primeros individuos. Volumen de aplicación sugerido 1000 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(SL) Sin Límite

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: NO ENTRE AL ÁREA TRATADA ANTES DE 24 HRS.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de abrir, revise que el envase esté debidamente cerrado. Con el equipo de protección personal indicado en la parte izquierda de esta etiqueta puesto, proceda a retirar el sello de seguridad y abra con cuidado la bolsa por la parte superior con el apoyo de unas tijeras o un cúter. Con la ayuda de una báscula



proceda a medir la cantidad de producto que va a aplicar. Mezcle el producto con agua en un envase por separado, posteriormente agite y proceda a vaciar su contenido en el tanque de aplicación continuando su agitación.

Al realizar la aplicación asegúrese de tener una cobertura total del follaje. Use la dosis menor en infestaciones bajas y la dosis más alta en infestaciones mayores.

CONTRAINDICACIONES:

No se aplique en cultivos para los que no tiene recomendación de uso en esta etiqueta. No se aplique cuando el cultivo esté en condiciones de estrés como sequía, temperaturas bajas extremas, deficiencias nutricionales, o cualquier otro factor que interfiera en el crecimiento del cultivo. No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35° C, o cuando haya posibilidades de lluvia.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si es utilizado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta. Cuando desconozca la fitotoxicidad potencial deberá hacerse una pequeña prueba previa a su aplicación para evitar efectos indeseables.

INCOMPATIBILIDAD:

No se recomienda la aplicación con ningún otro producto.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA: LAPISA, S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

LAPISA S.A. DE C.V.

Tel.: 352 526 13 00 / 352 690 2001
Carretera La Piedad-Guadalajara Km 5.5
Col. Camelinas, C.P. 59375
La Piedad, Michoacán, México.
info@lapisa.com