

Garra Ban MO 29[®]

RSCO-PEC-MEZC-1105-301-009-029

Garrapaticida y Mosquicida / Concentrado Emulsionable

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	%PESO
INGREDIENTES ACTIVOS	
CLORPIRIFOS ETIL: 0,0-dietil 0- (3,5,6, - tricloro - 2 piridinil) fosforotioato (Equivalente a 240 g de i.a/L a 25°C)	NO MENOS DE: 24.00 %
PERMETRINA: 3 - fenoxibenzil (1RS) - cis, trans 3 - (2,2 diclorvinil) - 2,2 dimetil ciclopropano carboxilato. (Equivalente a 50 g de i.a/L a 25°C.)	NO MENOS DE: 5.00 %
INGREDIENTES INERTES:	
Solvente y emulsificantes	NO MÁS DE: 71.00 %
	TOTAL 100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: ropa protectora, guantes, mascarilla, goggles y botas. Use un recipiente exclusivo para la preparación de la mezcla, no agite con la mano directamente, use una vara de madera como agitador. El producto sobrante se debe conservar en su envase original, manteniendo este perfectamente cerrado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE

PROTECCIÓN ADECUADO”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.”

PRIMEROS AUXILIOS:

Aleje a la persona intoxicada de cualquier fuente contaminada, para evitar mayor exposición quite la ropa contaminada y báñelo con abundante agua, coloque a la persona de lado con la cabeza más baja que el cuerpo, vigile que respire con facilidad. En casos de ingestión accidental, induzca el vómito y administre 3 cucharadas de carbón activado.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Clorpirifos: Es un producto que pertenece al grupo de los organofosforados, algunos síntomas de intoxicación pueden ser: dolor

ESPECIE:



de cabeza, náuseas, vómito, debilidad, visión borrosa, contracción de la pupila, sudoración, lagrimeo, salivación, descarga acuosa nasal y opresión torácica; diarrea, micción y defecación involuntarias, calambres y sensación de asfixia.

Permetrina: Es un producto que pertenece al grupo de los piretroides, los síntomas de intoxicación son nerviosismo, ansiedad, convulsiones, alergia en la piel, estornudos, rigidez de nariz.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO:

Se administrará inmediatamente sulfato de atropina al 1% a humanos 2-4 mg por vía intravenosa (en niños, una dosis menor de 0.5-2 mg según el peso) dependiendo de la gravedad de la intoxicación, se puede administrar 2 mg más de la atropina por vía intravenosa cada 15 minutos. Se continúa la administración repetida de la atropina durante 2-12 horas incluso más tiempo en casos severos. La dosis para bovinos y equinos 8-10 mL. Caninos, ovinos y porcinos, 2-5 mL. Repítase el tratamiento con intervalo necesario para mantener una atropinización, el sulfato de atropina es de uso delicado y no debe administrarse arbitrariamente.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.”

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.”

INSTRUCCIONES DE USO:

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

GarraBan MO 29[®] se emplea en baño de inmersión o aspersión para el control de garrapatas de 1 o más huéspedes en animales domésticos como: vacas, caballos, perros, cabras, ovejas y cerdos para el control de:

PLAGA	DOSIS	FRECUENCIAS DE APLICACION	INTERVALOS DE APLICACION
GARRAPATAS <i>Boophilus microptus, B. annulatus, Amblyomma cajennense, Dermacentor occidentalis, D. dissimilis, Anocentor nitens, Hyalomma spp.</i>	EN BAÑO POR INMERSION: Diluir 1 L / 1000 L de agua	La recarga debe ser efectuada cada vez que el volumen del baño disminuya 1000 L reponiendo el agua y agregando por lo menos 2 L más de GarraBan MO 29.	Se recomienda llevar a cabo un calendario estratégico de baños. El intervalo de aplicación dependerá del grado de infestación en los animales y en los potreros. También es muy importante tomar en cuenta la temperatura, o la época del año, la región y el pH del agua que se utilice para la dilución del producto.
PIOJOS CHUPADORES: <i>Haematopinus eurysternus, h. suis, Linognathus vitull, Solenopotes capillatus.</i> PIOJOS MASTICADORES: <i>Damalinea bovis, Bovicola caprae, B. limbatus, Melofagos sp., Lipoptena capreoli e Hippobosca variegata.</i>		Utilizar por lo menos 3 L de mezcla para bañar cada animal, procurando impregnar bien las áreas preferidas por las garrapatas: orejas (por dentro y por fuera), base de los cuernos y el resto de la cabeza, cuello, lomo, región de la cola, ubre, patas, panza y axilas.	
MOSCAS: Mosca de cuerno (<i>Siphona (Haematobia) irritans</i>) y Mosca brava del establo, (<i>Stomoxys calcitrans</i>). LARVAS DE MOSCAS, MIASIS (BICHERAS O GUSANERAS): <i>Lucilia sp., Chrysomyia sp., Calliphora sp.</i>	BAÑO POR ASPERSION: Diluir 1 L / 1000 L de agua.		

ESPECIE:



MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

El baño de inmersión debe estar situado geográficamente en la parte mas alta del terreno, si se encuentra en una zona baja permitirá la entrada de agua de lluvia, tierra o materia orgánica.

Con el equipo de seguridad puesto, abra el bote de GarraBan MO 29®, con la ceja que trae la tapa.

Una vez calculado el volumen del agua (cubicación) y llenada la tina con agua limpia, se adiciona el GarraBan MO 29®, se prepara una premezcla del garrapaticida, (por ejemplo 1 L en 4 L de agua) después se agrega la premezcla a lo largo del baño de inmersión garrapaticidas.

Se agita vigorosamente la solución garrapaticida con un re movedor o con una moto bomba durante 15 minutos, posteriormente se arrea el ganado hacia el baño.

Si la aplicación es por aspersión:

Se llena el equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad, se adiciona la dosis recomendada de GarraBan MO 29®, se agrega el resto de agua, se agita con un palo de madera durante 15 minutos.

PERIODO DE RETIRO:

No sacrificar animales hasta 7 días después del último tratamiento.

Este producto es tóxico para aves y felinos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

TITULAR DEL REGISTRO Y FORMULADOR:

AGROformuladora Delta S.A. de C.V.
Ave. Chapultepec No. 64800 Monterrey, N.L.
Tels. 01 (81) 83-58-12-47, 49 y 53
www.agrodelta.com.mx

HECHO EN MÉXICO

DISTRIBUIDO POR:

LAPISA, S. A. DE C. V.
Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,
Col. Camelinas, C. P. 59375,
La Piedad Michoacán, México.
Tel + 52(352) 526-13-00
www.lapisa.com
287-SAN-FT-01A



ESPECIE:

