

Lapitromicina[®]

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-211

Solución Inyectable

USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada mL contiene:	
Tulatromicina	100 mg
Vehículo c. b. p.	1 mL

INDICACIONES:

Antibiótico macrólido.

Lapitromicina[®] está indicado para **Bovinos de engorda (incluyendo becerros lactantes)**

y **bovinos lecheros no lactantes**: en el tratamiento de enfermedades respiratorias como el complejo respiratorio bovino (CRB) asociada con *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* y *Mycoplasma bovis*. Así como para el tratamiento de queratoconjuntivitis infecciosa bovina (QIB) causada por *Moraxella bovis*. Y en afecciones podales como pododermatitis interdigital (gabarro) causada por *Fusobacterium necrophorum* y *Porphyromonas levii*.

Porcinos: para el tratamiento y metafilaxis del complejo respiratorio de ganado porcino (CRP) asociadas con *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica* y *Haemophilus parasuis*.

DOSIS:

Bovinos de engorda (incluyendo becerros lactantes) y bovinos lecheros no lactantes:

1 mL por cada 40 kg de peso corporal (equivalente a 2.5 mg de Tulatromicina por kg de peso corporal). Dosis única. No administrar más de 7.5 mL por sitio de aplicación.

Porcinos: 1 mL por cada 40 kg de peso corporal (equivalente a 2.5 mg de Tulatromicina por kg de peso corporal). Dosis única. No administrar más de 2.5 mL por sitio de aplicación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos de engorda (incluyendo becerros lactantes) y bovinos lecheros no lactantes: Subcutánea en la tabla del cuello.

Porcinos: Intramuscular.

PERÍODO DE RETIRO:

Bovinos de engorda (incluyendo becerros lactantes) y bovinos lecheros no lactantes: 22 días.

Porcinos: 5 días.

ADVERTENCIAS:

Producto para uso exclusivo en animales. No utilizar el producto en especies distintas a las mencionadas en la etiqueta.

No administrar el producto en animales con sensibilidad a los macrólidos.

No administrar el producto simultáneamente con otros antibióticos macrólidos o lincosamidas.

No administrar el producto en vacas productoras de leche para consumo humano.

No administrar el producto en animales en periodo de gestación.



El producto puede causar irritación en piel y ojos, en caso de contacto accidental, lávese con abundante agua.

En caso de inyección accidental, consulte a su médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta/prospecto del producto.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, a una temperatura no mayor a 25 °C.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Una vez abierto, utilice el producto por no más de 30 días.

Los recipientes vacíos, así como cualquier contenido residual deben desecharse de acuerdo a la normatividad vigente / Eliminar los envases en el centro de acopio más cercano.

PRESENTACIÓN:

Frascos con 100, 250 y 500 mL.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO**

Hecho en México por:

LAPISA, S. A. DE C. V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,

Col. Camelinas, C. P. 59375,

La Piedad Michoacán, México.

Tel + 52(352) 526-13-00

www.lapisa.com

297-SAN-FT-01A

