

## MAXI-LAP<sup>®</sup>

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-207

Premezcla  $\beta$ -agonista promotor de crecimiento y rendimiento.

### USO VETERINARIO

#### FÓRMULA:

Cada kg contiene:	
Clorhidrato de zilpaterol	48 g
Excipiente c.b.p.	1 kg

#### DESCRIPCIÓN:

**MAXI-LAP<sup>®</sup>** es una premezcla a base de un  $\beta$ -agonista (Zilpaterol) a una concentración del 4.8%, que actúa como promotor de crecimiento y rendimiento para finalizar bovinos de engorda.

#### INDICACIONES:

**MAXI-LAP<sup>®</sup>** está indicado para mejorar el grado de rendimiento de la canal, disminuyendo el depósito de grasa, incrementa la ganancia de peso y mejora la conversión alimenticia en bovinos de engorda.

#### ESPECIES:

Bovinos de engorda.

#### DOSIS:

Administrar 0.15 mg/kg de peso vivo por día durante 30 días, equivalente a una concentración en el alimento de 6 ppm para un animal con peso promedio de 400 kg que ingiere aprox. 10 kg de alimento terminado (con un contenido de 90% de materia seca) por día durante los últimos 30 días de la engorda en corral. Por lo tanto, en la práctica se recomiendan 125 g de **MAXI-LAP<sup>®</sup>** por tonelada de alimento terminado con un contenido de 90% de materia seca.

$$\frac{3.125 \text{ (valor constante) X Peso promedio corporal}}{\text{Consumo promedio de alimento (kg)}} = \text{grs de Maxilap en un tonelada de alimento}$$

#### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado con el alimento terminado.

#### PRESENTACIONES:

Sacos con 10 kg.

#### PERÍODO DE RETIRO:

No deberá usar este producto 72 horas antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

#### ADVERTENCIAS:

La dosificación debe hacerse con exactitud para respetar la dosis recomendada.

No exceder una dosis superior a 90 mg de zilpaterol/cabeza/día.

No se utilice en animales destinados para reproducción.

El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco a temperatura de entre 15 y 30 °C.

Para el manejo de **MAXI-LAP<sup>®</sup>** siga las recomendaciones para la elaboración de premezcla: utilice mascarilla con filtro, guantes, lentes protectores y overol. En caso de contacto con la piel, enjuague con abundante agua corriente.

Evite la inhalación directa del producto y contacto directo con la piel y ojos.

No fume ni consuma alimentos durante su manejo. En caso de ingestión accidental, puede administrarse un bloqueador  $\beta_2$  como el propanolol, bajo estricta supervisión médica.

Almacénesse lejos de los alimentos y manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Deseche los envases en el centro de acopio más cercano.



**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
CUANTIFICADA  
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO  
VETERINARIO**

Hecho en México por:  
**LAPISA, S. A. DE C. V.**  
Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,  
Col. Camelinas, C. P. 59375,  
La Piedad Michoacán, México.  
Tel + 52(352) 526-13-00  
[www.lapisa.com](http://www.lapisa.com)  
003-SAN-FT-02A

