

Neumoclor-200®

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-153

Premezcla antibiótica

USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada kg contiene:	
Clortetraciclina	200 g
Excipiente c.b.p.	1 Kg

INDICACIONES:

Premezcla antibiótica indicada para el tratamiento de las enfermedades de aves (pollo de engorda, gallinas reproductoras), cerdos y bovinos de engorda y productores de leche ocasionadas por gérmenes susceptibles a la Clortetraciclina, así como coadyuvante en infecciones secundarias a una enfermedad viral.

Terapéutico:

	AVES (Pollo de engorda y gallinas reproductoras)	CERDOS	BOVINOS (Engorda y productores de leche)
Sinovitis infecciosa (<i>Mycoplasma synoviae</i>)	100 a 200 g de clortetraciclina por tonelada de alimento terminado, (Equivalente a 500 g a 1000 g de Neumoclor-200® por tonelada de alimento terminado). Administrar de 7 a 14 días.		
Mortalidad por <i>E. coli</i> .	500 g de clortetraciclina por tonelada de alimento terminado, (Equivalente a 2.5 kg de Neumoclor-200® por tonelada de alimento terminado). Administrar durante 5 días.		
Reducción de incidencia de Abortos por <i>Leptospira interrogans</i> serovariedad <i>pomona</i> .		400 g de clortetraciclina por tonelada de alimento terminado (Equivalente a 2 kg de Neumoclor-200® por tonelada de alimento terminado). Administrar por no más de 14 días.	
Diarrea y neumonías bacterianas. (<i>E. coli</i> , <i>Salmonella choleraesuis</i> , <i>Pasteurella multocida</i>)		400 g de clortetraciclina por tonelada de alimento terminado (Equivalente a 2 kg de Neumoclor-200® por tonelada de alimento terminado). Administrar por no más de 14 días.	500 a 4000 g por tonelada de alimento terminado, (Equivalente de 2.5 kg a 20 kg de Neumoclor-200® por tonelada de alimento terminado.) administrar por no más de 5 días.
Anaplasmosis (<i>Anaplasma marginale</i>)			25 a 42.2 g de clortetraciclina por tonelada de alimento terminado (Equivalente de 0.125 kg a 0.211 kg de Neumoclor-200® por tonelada de alimento terminado.) administrar de 5 a 7 días.





VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado con el alimento terminado.

PERÍODO DE RETIRO:

No utilizar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 5 días posteriores al tratamiento.

No utilizar la leche de los animales tratados hasta 10 días posteriores al tratamiento.

No utilizar este producto en aves de postura.

ADVERTENCIAS:

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a una temperatura entre 15 a 30 °C.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIÓN:

Saco de 25kg.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Hecho en México por:

LAPISA, S. A. DE C. V.

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,

Col. Camelinas, C. P. 59375,

La Piedad Michoacán, México.

Tel + 52(352) 526-13-00

www.lapisa.com

327-SAN-FT-01A



ESPECIE:

