

Sulfatropin® inyectable

Número de registro Q-2083-040

Sulfametoxazol y trimetoprim en solución inyectable
USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada mL contiene:	
Sulfametoxazol	200 mg
Trimetoprim	40 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

DESCRIPCIÓN:

Antibiótico.

Sulfatropin® Inyectable es una solución inyectable de sulfametoxazol y trimetoprim que por su sinergismo tiene un efecto bactericida debido a un bloqueo secuencial de enzimas bacterianas que intervienen en la síntesis del ácido fólico, lo que provoca la muerte de la célula bacteriana.

INDICACIONES:

Está indicado en bovinos de engorda y productores de leche, equinos, ovinos, caprinos, aves (engorda y postura), perros y gatos; en casos donde se requiera de una potente acción antibacteriana sistémica: infecciones de los aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario; septicemias, mastitis y pododermatitis. La combinación es activa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas tales como especies susceptibles de los géneros *Actinomyces*, *Actinobacillus* (*Haemophilus*), *Bordetella*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *Fusobacterium*, *Klebsiella*, *Pasteurella*, *Proteus*, *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, así como *Escherichia coli* y especies susceptibles de *Streptococcus* y *Staphylococcus*. Son moderadamente sensibles la mayoría de las especies de los géneros *Brucella*, *Erysipelothrix*, *Nocardia*, *Moraxella* y algunas del género *Streptococcus*. Son resistentes los géneros *Pseudomona* y *Mycobacterium*.

ESPECIES:

Bovinos de engorda y productores de leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves (engorda y postura), perros y gatos.

DOSIS:

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, perros y gatos: 1 mL por cada 17 a 20 kg de peso corporal cada 24 horas.

En aves (engorda y postura): Diluir 70 mL de **Sulfatropin® Inyectable** en 100 mL de solución salina fisiológica. De esta dilución aplicar 0.2 mL por cada kg de peso corporal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves (engorda y postura), perros y gatos: Intramuscular o subcutánea.
Equinos: Intravenosa lenta.

PERIODO DE RETIRO:

No usar este producto 7 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

No consuma los huevos hasta 10 días después del último tratamiento.


No destinar para consumo humano la leche proveniente de animales tratados, hasta 3 días después de la última aplicación.

PRESENTACIONES:

Frasco con 100 y 250 mL.



ESPECIE:




ADVERTENCIAS:

No administrar este producto en equinos destinados para consumo humano.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz a una temperatura entre 15 y 30 °C.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



066-SAN-FI-01A

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ESPECIE:

