

Sulfatropin® Oral

Suspensión oral

Número de Registro Q-2083-175

USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Sulfametoxazol	40 mg
Trimetoprim	8 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

DESCRIPCIÓN:

Sulfatropin® Oral es una formulación de sulfametoxazol y trimetoprim la cual tiene un efecto sinérgico con actividad bactericida debido a un bloqueo secuencial de enzimas bacterianas que intervienen en la síntesis del ácido fólico, lo que provoca la muerte de la célula bacteriana.

INDICACIONES:

Antimicrobiano de amplio espectro indicado en el tratamiento de infecciones ocasionadas por gérmenes Gram (-) y Gram (+) susceptibles a la combinación del producto. Actúa contra infecciones del tracto respiratorio, digestivo y vías urinarias.

La combinación se absorbe bien al ser administrado por vía oral, y alcanza niveles máximos 1-4 horas después de la dosis. La combinación es activa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas tales como especies susceptibles de los géneros *Actinomyces*, *Actinobacillus* (*Haemophilus*), *Bordetella*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *Fusobacterium*, *Klebsiella*, *Pasteurella*, *Proteus*, *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, así como *Escherichia coli*, y especies susceptibles de *Streptococcus* y *Staphylococcus*. Son moderadamente sensibles la mayoría de las especies de los géneros *Brucella*, *Erysipelothrix*, *Nocardia*, *Moraxella* y algunas del género *Streptococcus*. Son resistentes los géneros *Pseudomonas* y *Mycobacterium*.

USO:

Caninos y felinos.

DOSIS

15 mg (12.5 mg Sulfametoxazol / 2.5 mg Trimetoprim) por kg de peso vivo cada 12 horas. Caninos: 5 mL por cada 16 kg de peso vivo cada 12 horas durante 5 días.

Felinos: 1.5 mL por cada 5 kg de peso vivo cada 12 horas durante 5 días

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

ADVERTENCIAS:

Agite antes de usar.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No utilizar en hembras gestantes ni en periodo de lactancia.

No administrar en pacientes con hipersensibilidad a las sulfas, tiacidas o a las sulfonilureas, grave deterioro de la función renal o hepática.

Lea el prospecto / instructivo anexo antes de utilizar el producto.

Hecho en México por:

LAPISA, S.A. de C.V.


Carr. La Piedad-Guadalajara km 5.5,

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel: +52 (352) 5261300.

www.lapisa.com



PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

