

Ampipen

Polvo para solución inyectable.

REG. SAGARPA Q-2083-007

FORMULA:

Cada mL de solución reconstituida contiene:
Ampicilina sódica 100 mg
Vehículo c.b.p. 1 mL

INDICACIONES:

Antibiótico de amplio espectro indicado en equinos, caninos y felinos para el tratamiento de enfermedades producidas por gérmenes gram positivos y gram negativos susceptibles a la acción de la ampicilina: infecciones del aparato digestivo y respiratorio, infecciones del tracto urogenital, septicémicas.

DOSIS Y ADMINISTRACION:

Aplicar el diluyente al frasco de polvo estéril y mezclar perfectamente. Aplicar mediante inyección intramuscular o subcutánea a razón de:

Caninos:


Infecciones grampositivas: 5 mg/kg cada 8 horas.
Infecciones gramnegativas: 10 mg/kg cada 8 horas.
Infecciones urinarias: 6.6 mg/kg cada 12 horas, durante 3 a 7 días.
Infecciones en tejidos blandos: 10–20 mg/kg cada 8 horas, durante 7 días.
Neumonía: 22 mg/kg cada 8 horas, durante 7 a 14 días.
Bacteriemia: 20–40 mg/kg cada 6 a 8 horas, durante el tiempo que sea necesario.
Infecciones óseas o meningitis: 22 mg/kg cada 6 a 8 horas, durante el tiempo que sea necesario.

Felinos:

Infecciones grampositivas: 5 mg/kg cada 8 horas.
Infecciones gramnegativas: 10 mg/kg cada 8 horas.
Infecciones sistémicas: 7-11 mg/kg cada 8 a 12 horas, durante el tiempo que sea necesario.

Equinos:

Para infecciones susceptibles:
a). 10-50 mg/kg IM tres veces al día.
b). Potros: 11 mg/kg cada 6 horas IM.
c). Potros: 15-30 mg/kg IM cada 6 a 8 horas.



En caso de infusión intra-uterina: 1 -3 g. Los tratamientos se realizaran con frecuencia diaria o cada tercer día durante 3-7 días.

ADVERTENCIAS:

Pueden presentarse casos de hipersensibilidad en animales alérgicos a la penicilina. En tal caso, el tratamiento debe de ser discontinuado y el animal debe tratarse con antihistamínicos. No usar este producto 15 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano. Manténgase fuera del alcance de los niños.

INCOMPATIBILIDAD:

No utilizar en animales con antecedentes de reacciones alérgicas o hipersensibilidad a las penicilinas, cefalosporinas o sus análogos.

PRESENTACION:

Frasco con 2 g con su diluyente respectivo.

ALMACENAJE:

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA