



# Ovinos

## Bovimune Clostri 10

Bacterina – Toxoides en suspensión inyectable

REG. SAGARPA B-2083-020

### FÓRMULA:

Contiene toxoides y cultivos completos inactivados de *Clostridium chauvoei*, *septicum*, *sordellii*, *novyi* serotipo B, *tetani*, *haemolyticum*, *perfringens* tipo “A”, “B”, “C” y “D” en hidróxido de aluminio como adyuvante.

### INDICACIONES:

Bovimune<sup>□</sup> Clostri 10 esta indicado para la inmunización de bovinos y ovinos sanos, como auxiliar en la prevención de las enfermedades causadas por *Clostridium chauvoei*, *septicum*, *sordellii*, *novyi*, *tetani*, *haemolyticum*, *perfringens* tipo “A”, “B”, “C” y “D”.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar por vía subcutánea de preferencia en la tabla del cuello, utilizando medidas asépticas.

### DOSIS:

**Ovinos, Caprinos:** 2.5 mL.

Programa de vacunación:

Ovinos y caprinos:

**Crías:** a partir del segundo o tercer mes de edad y un refuerzo 4 semanas después.

**Hembras gestantes:** Administrar 2.5 mL por vía subcutánea y un refuerzo de 6 a 4 semanas antes del parto para conferir una excelente protección tanto a la madre como a la cría, estas últimas mediante el calostro.

**Animales adultos:** Administrar 2.5 mL por vía subcutánea y un refuerzo 4 semanas después.

En todos los casos dependiendo de la incidencia y del tipo de explotación revacunar cada 6 ó 12 meses.



### ADVERTENCIAS:

Agítese bien antes de usarse.

Una vez abierto el envase utilice el contenido completamente.

Mantener en refrigeración a una temperatura entre 2 ° y 7 °C, no congelar.

Cualquier biológico puede causar reacciones anafilácticas. En tal caso se recomienda el uso de epinefrina seguida de terapia de soporte apropiada. Este producto ha demostrado ser eficaz en animales sanos. Puede no producirse una respuesta inmune protectora si los animales están incubando una enfermedad infecciosa, inmunodeprimidos, mal nutridos, parasitados ó estresados debido a transporte o por condiciones ambientales adversas, o si la vacuna no es administrada de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

Desechar el envase en forma segura, entiérrese o incinérrese.

### PRESENTACIONES:

Frasco con 10 y 50 dosis.

### USO VETERINARIO.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.