



Porcinos

Diramox® Premix 50%

Premezcla Antibiótica

REG. SAGARPA Q-2083-172

FÓRMULA:

Cada kg contiene:
 Amoxicilina trihidratada 500 g
 Excipiente c.b.p. 1 kg



INDICACIONES:

Premezcla antibiótica indicada para la prevención y tratamiento de las enfermedades bacterianas en aves, cerdos y bovinos; causadas por *Salmonella spp*, *Escherichia coli*, *Pasteurella spp*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus spp*, *Haemophilus parasuis*, *Streptococcus spp*, *Actinobacillus spp* y *Clostridium spp*.

USO EN:

Bovinos, porcinos y aves.

DOSIS:

Especie	Tratamiento Terapéutico
Aves	400 a 800 g por tonelada de alimento durante 5 – 7 días.
Bovinos	Becerras lactantes: 600 a 1000 g por tonelada de alimento durante 10 -20 días. Becerras destete: 500 a 720 g por tonelada de alimento durante 8– 15 días. Becerras engorda: 1.6 a 2.4 kg por tonelada de alimento durante los primeros 15 – 21 días del inicio del ciclo intensivo de engorda.
Cerdos	Lechones: 400 a 600 g por tonelada de alimento durante 5 – 7 días. Adultos: 600 a 800 g por tonelada de alimento durante 5 – 7 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral. Mezclado con el alimento.

ADVERTENCIAS:

Tiempo de retiro:

Carne: becerros y porcinos: 20 días.

Aves de engorda: 7 días

No se administre a animales con antecedentes alérgicos a la penicilina.

No se administre este producto a bovinos en producción de leche que se destine al consumo humano.

No se administre este producto a aves en producción de huevo que se destine al consumo humano.



Porcinos

Consérvese en un lugar fresco y seco.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Sacos de 10 kg.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

