



# Porcinos

## Diramox® Premix

Premezcla Antibiótica

REG. SAGARPA Q-2083-081

### FORMULA

Cada kg. contiene:

Amoxicilina trihidratada	200 g
Excipiente, c.b.p.	1000 g



### INDICACIONES:

Premezcla Antibiótica indicada para la prevención de infecciones bacterianas susceptibles a la amoxicilina en aves, cerdos y becerros lactantes. Así como en infecciones secundarias a una enfermedad viral.

### DOSIS:

Lechones: 1 – 1.5 kg. por tonelada de alimento durante 5 – 7 días.

Cerdas: 1.5 – 2 kg. por tonelada de alimento durante 5 – 7 días.

Aves: 1-2 kg. por tonelada de alimento durante 5 – 7 días.

Becerros lactantes: 1.5 – 2.5 kg. por tonelada de alimento durante 10 -20 días.

Becerros destete: 1.250 – 1.800 kg. por tonelada de alimento durante 8– 15 días.

Engorde: 4 – 6 kg. por tonelada de alimento durante los primeros 15 – 21 días del inicio del ciclo intensivo de engorde.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral. Mezclado en el alimento.

### ADVERTENCIAS:

No se administre a animales con antecedentes alérgicos a la penicilina.

No utilizar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 48 horas posteriores al tratamiento.

### PRESENTACIONES:

Saco de 20 kg.

### CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

### SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

