



# Aves

## Diramox<sup>®</sup> Soluble

Amoxicilina inyectable de Larga Acción

REG. SAGARPA Q-2083-133

### FORMULA

Cada 100 g contienen:

Amoxicilina (como Amoxicilina trihidrato)	75 g
Excipiente, c.b.p.	100 g

### INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas susceptibles a la Amoxicilina en aves y cerdos. Así como adyuvante en infecciones secundarias a una enfermedad viral.

### DOSIS

Los animales tratados no deben tener acceso a otra fuente de agua durante el tratamiento. Administrar de 15 a 20 mg de ingrediente activo por kg de peso corporal.

**Pollos:** Disuelva 100 g en 450 lt de agua de bebida fresca. Esta posología proveerá medicamento a 5,000 kg de peso, por un día. Administre agua de bebida medicada cada tercer día (dos días de medicación). En casos severos, administrar cada tercer día durante 5 días (3 días de medicación).

**Patos:** Administre en agua de bebida 20 mg/kg de peso. La administración deberá ser cada tercer día, durante tres días (dos días de medicación). Debido a que el agua que es ingerida varía dependiendo de la temperatura, luz y régimen alimenticio, no puede ser proporcionada la dilución exacta. De cualquier manera, la cantidad de Diramox<sup>®</sup> Soluble debe de ser calculada tomando en cuenta el agua ingerida y el peso total de los patos involucrados.

**Cerdos:** Administrar diariamente en agua de bebida 20 mg/kg de peso. La dosis deberá de ser dividida y administrada con intervalos aproximados de 12 horas durante 5 días.



**Pavos:** Administrar en agua de bebida de 15 a 20 mg de Amoxicilina por kg de peso. La administración deberá ser suministrada durante 5 días de manera alterna (3 días de medicación). La dosificación deberá ser calculada tomando en cuenta la cantidad normal de agua a ingerir y el peso total de los pavos involucrados.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
Oral.

### ADVERTENCIAS

- No se administre a animales con antecedentes alérgicos a la penicilina.
- Durante el tratamiento, los animales no deberán estar destinados al consumo humano.
- Periodo de retiro:  
Pollos: 24 horas.  
Pavos: 5 días.  
Patos: 7 días.  
Cerdos: 24 horas.
- No consuma los huevos de aves tratadas hasta 24 horas después del último tratamiento.

### PRESENTACIONES

Tarro con 900 g.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**

**SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA**