



Porcinos

Diramox® Soluble

Polvo Soluble

REG. SAGARPA Q-2083-133

FORMULA

Cada 100 g contienen:

Amoxicilina (como Amoxicilina trihidrato) 75 g
Excipiente, c.b.p. 100 g

INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas susceptibles a la Amoxicilina en aves y cerdos. Así como adyuvante en infecciones secundarias a una enfermedad viral.

DOSIS

Los animales tratados no deben tener acceso a otra fuente de agua durante el tratamiento. Administrar de 15 a 20 mg de ingrediente activo por kg de peso corporal.

Pollos: Disuelva 100 g en 450 lt de agua de bebida fresca. Esta posología proveerá medicamento a 5,000 kg de peso, por un día. Administre agua de bebida medicada cada tercer día (dos días de medicación). En casos severos, administrar cada tercer día durante 5 días (3 días de medicación).

Patos: Administre en agua de bebida 20 mg/kg de peso. La administración deberá ser cada tercer día, durante tres días (dos días de medicación). Debido a que el agua que es ingerida varía dependiendo de la temperatura, luz y régimen alimenticio, no puede ser proporcionada la dilución exacta. De cualquier manera, la cantidad de Diramox® Soluble debe de ser calculada tomando en cuenta el agua ingerida y el peso total de los patos involucrados.

Cerdos: Administrar diariamente en agua de bebida 20 mg/kg de peso. La dosis deberá de ser dividida y administrada con intervalos aproximados de 12 horas durante 5 días.



Pavos: Administrar en agua de bebida de 15 a 20 mg de Amoxicilina por kg de peso. La administración deberá ser suministrada durante 5 días de manera alterna (3 días de medicación). La dosificación deberá ser calculada tomando en cuenta la cantidad normal de agua a ingerir y el peso total de los pavos involucrados.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

ADVERTENCIAS

- No se administre a animales con antecedentes alérgicos a la penicilina.
- Durante el tratamiento, los animales no deberán estar destinados al consumo humano.
- Periodo de retiro:
Pollos: 24 horas.
Pavos: 5 días.
Patos: 7 días.
Cerdos: 24 horas.
- No consuma los huevos de aves tratadas hasta 24 horas después del último tratamiento.

PRESENTACIONES

Tarro con 900 g.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

