



# Aves

## LAPI-RESP FT®

Premezcla antibiótica

REG. SAGARPA Q-2083-161

### FÓRMULA:

Cada kg contiene:

Tilosina tartrato	110 g
Florfenicol	40 g
Excipiente c.b.p.	1 kg



### USO EN:

Aves y Cerdos.

### INDICACIONES:

Premezcla antibiótica indicada para la prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias y digestivas cerdos de todas las edades y en aves de engorda, causadas por *Salmonella spp*, *Escherichia coli*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Haemophilus parasuis*, *Streptococcus suis*, *Mycoplasma spp* y *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Especie	Tratamiento Preventivo	Tratamiento Terapéutico
<b>Aves</b>	Administrar 500 g de Lapi-Resp FT <sup>□</sup> por tonelada de alimento terminado, (20 ppm de florfenicol y 55 ppm de tilosina), durante un período de 5 a 7 días.	Administrar 1 a 2 Kg de Lapi-Resp FT <sup>□</sup> por tonelada de alimento terminado, (40 a 80 ppm de florfenicol y 110 a 220 ppm de tilosina), durante un período de 5 a 7 días.
<b>Cerdos</b>	Administrar 500 g de Lapi-Resp FT <sup>□</sup> por tonelada de alimento terminado, (20 ppm de florfenicol y 55 ppm de tilosina), durante un período de 5 a 7 días.	Administrar 1 Kg de Lapi-Resp FT <sup>□</sup> por tonelada de alimento terminado, (40 ppm de florfenicol y 110 ppm de tilosina), durante un período de 5 a 7 días.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado con el alimento terminado.

### ADVERTENCIAS:

No utilizar este producto en aves de postura.

No deberá usar este producto 7 días antes del sacrificio de aves y cerdos destinados para consumo humano.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIONES:

20 Kg.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

