



Bovinos

LAPIPEN® 300

Penicilina G procaína acuosa

REG. SAGARPA Q-2083-095

FÓRMULA:

Cada ml contiene:
Penicilina G Procaína: 300,000 U.I.
Vehículo c.b.p. 1 mL

INDICACIONES:

Antibiótico para el tratamiento de infecciones producidas por gérmenes susceptibles a la Penicilina.

USO EN:

Bovinos, porcinos, equinos, caprinos y ovinos.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía intramuscular profunda. Dosis: De 11,000 a 22,000 U.I. de Penicilina por kg de peso. Aplicar de 1 a 2 mL por cada 25 kg de peso. No exceder el tratamiento por más de 4 días consecutivos.

ADVERTENCIAS:

Agítese antes de usarse.

Mantener en un lugar seco y fresco, protegido de la luz.

No administrarse en casos con historia de hipersensibilidad o alergia a las penicilinas.

Se han presentado reacciones de naturaleza alérgica o anafiláctica, en animales hipersensitivos después de una inyección de Penicilina. Si esto ocurre, discontinuar el tratamiento y considerar la administración de antihistamínicos.

Si llegara a excederse el tratamiento por más de 4 días consecutivos, puede llegar a alterarse el periodo de retiro.

No utilizar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 48 horas posteriores al tratamiento. El periodo de retiro en carne dependerá de la especie tratada:



Bovinos: 10 días.
Ovinos y caprinos: 9 días
Porcinos: 7 días.
Becerras: 7 días.

PRESENTACIONES:

Frascos con 250 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

