



Bovinos

Laptil-300

Tilmicosina en solución inyectable

REG. SAGARPA Q-2083-169

FÓRMULA

Cada mL contiene:
Tilmicosina (Como fosfato) 300 mg
Vehículo, c.b.p. 1 mL

INDICACIONES:

Laptil-300 está indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias principalmente asociadas a *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*, *Pasteurella multocida* y otros organismos susceptibles a la tilmicosina.

USO EN:

Ovinos y bovinos

DOSIS:

En Bovinos adultos, vaquillas, terneros: Administre una sola dosis de 10 mg/kg de peso (1 mL/ 30 kg de peso).

En Ovinos mayores de 15 kg, administrar una dosis de 10 mg/kg de peso (1 mL/ 30 kg de peso).

No se administre más de 10 mL por sitio de inyección.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar únicamente por vía subcutánea, preferentemente aplicar en la tabla del cuello.

ADVERTENCIAS:

No deberá usar este producto 42 días antes del sacrificio de bovinos y ovinos destinados al consumo humano.

No utilizar en bovinos en lactación.

No aplicar con equipos de inyección automática.

Evite el contacto con la piel y mucosas mediante el uso de protección adecuada (guantes, gafas).

No administre por vía intravenosa ya que puede causar la muerte del animal.

No administre por vía intramuscular ya que puede causar reacción local y representar pérdidas por recortes a la canal.



La inyección de tilmicosina en los humanos, cerdos, caballos y cabras puede causar la muerte.

La toxicidad en el hombre no se produce por manipulación del producto, únicamente por inyección o ingestión accidental. En este caso acudir de inmediato con el médico.

El sistema cardiovascular es el más afectado por la toxicidad, que podría ser debida al bloqueo de los canales de calcio.

El uso de epinefrina como terapia está contraindicado.

Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Frasco de 500 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

USO VETERINARIO

