



Bovinos

Mastrix

Solución Intramamaria

REG. SAGARPA Q-2083-076

FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Lincomicina	20.0 mg
Neomicina	20.0 mg.
Dexametasona	0.1 mg.
Vehículo c.b.p.	1.0 mL.

INDICACIONES:

Mastrix es una solución acuosa para infusión intramamaria a base de Lincomicina al 20%, Neomicina al 20% y Dexametasona, para el tratamiento de mastitis subaguda, aguda o crónica en bovinos producida por microorganismos susceptibles a la fórmula.

DESCRIPCIÓN

El producto ha sido diseñado para el tratamiento y el control de las mastitis subagudas, agudas o crónicas, acompañadas de dolor e inflamación, en bovinos, originadas por microorganismos susceptibles a la Lincomicina y Neomicina. El potente corticosteroide facilita la difusión de los antibióticos en los tejidos inflamados.

La medicación se realiza vía intramamaria después de un buen ordeño del cuarto afectado, aplicando el contenido de una jeringa de 10 mL, con un ligero masaje hacia arriba.

El tratamiento se puede repetir cada 12 horas, durante 3 o 4 días de acuerdo con la evolución del padecimiento

Siendo la Lincomicina un antibiótico de amplio espectro con acción contra gérmenes gram positivos y gram negativos, su asociación con la Neomicina, también de amplio espectro crean una amplia gama de acción antibacteriana contra los principales gérmenes involucrados en los procesos mastíticos, como son:



Gram positivos:

Staphylococcus aureus.
Streptococcus agalactiae.
Streptococcus dysgalactiae.
Streptococcus uberis
Streptococcus pyogenes.

Gram negativos:

Escherichia coli
Klebsiella spp.
Shigella spp.
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Mycoplasma spp.

Durante el proceso de esta enfermedad se produce la inflamación de la glándula acompañada por edema, calor y dolor. La dexametasona ayuda a aliviar estos signos, además de permitir una mejor difusión de los antibióticos a través de los tejidos inflamados, disminuyendo el tiempo de recuperación.

ESPECIES INDICADAS:

Bovinos.



Bovinos

DOSIS:

La medicación se realiza vía intramamaria después de un buen ordeño del cuarto afectado, aplicando el contenido de una jeringa de 10 mL, con un ligero masaje hacia arriba. El tratamiento se puede repetir el cada 12 horas, durante 3 o 4 días de acuerdo con la evolución del padecimiento

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramamaria

ADVERTENCIAS:

No deberá usarse la leche procedente de los animales tratados con este producto hasta 4 días después de la última aplicación.

Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Caja con 24 jeringas de 10 mL

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

