



Porcinos

Porciprost

REG. SAGARPA Q-2083-078

FORMULA

Cada mL Contiene:
Cloprostenol. 0.0875 mg.
Agua w.f.i. c.b.p. 1.0000 mL.

DESCRIPCIÓN

Porciprost, es una Prostaglandina para uso en porcinos para la sincronización del estro y ovulación con ciclos normales e inducción de parto así como coadyuvante en el tratamiento de, Metritis crónica y como inductor del aborto en gestaciones no deseadas.

INDICACIONES

Porciprost: Para la inducción del parto en cerdas.

Cerdas: Porciprost en cerdas induce el parto y de este modo provee más oportunidades para el manejo eficiente y conveniente de una variedad de sistemas.

Permite que el manejo de cerdas y primerizas sea llevado a cabo eficientemente.

Disminuye los partos los fines de semana, días festivos y durante la noche.

Facilita la supervisión de partos.

Facilita el entrecruzamiento.

Permite planear partos y esquemas a conveniencia

Previene que cerdas y primerizas tengan un período de preñez prolongado.

Permite el uso óptimo de parideros y equipos.

Porciprost debe ser usado solo en cerdas que lleven registros de servicios adecuados.

Porciprost, esta indicado para porcinos en:

Usos terapéuticos:

- A: Estro no visible
- B: Término de preñez normal no deseada.
- C: Remover fetos momificados.
- D: Endometritis crónica (piometra).
- E: Sincronización del celo.
- F: Terminación de Pseudopreñez.



Porciprost. Permite un mejor tratamiento en la concepción y el parto.

Porciprost. Se recomienda Para controlar el período de celo de cada animal, Porciprost . es útil Para sincronizar el período de celo en grupos de cerdas con objeto de fomentar el tratamiento de la piara en grupos de tamaño adecuado para la alimentación, inseminación artificial.

Se mejoran las posibilidades de mantener la piara en un buen nivel reproductivo y se reduce el número de cerdas estériles al final del programa de reproducción.

Porciprost puede ser utilizado para inducir la luteolisis seguida del estro y ovulación.

DOSIS:

Porcinos: Administrar a las cerdas 2 ml equivalente a 175 mcg. de Cloprostenol

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Porciprost debe de administrarse mediante inyección intramuscular profunda.



Porcinos

MECANISMO DE ACCIÓN

En el ciclo estral en su fase luteínica Porciprost provoca a nivel de ovario un descenso en los niveles de concentración de los receptores de la hormona luteinizante (LH) provocando así la regresión del cuerpo luteo y una pronta disminución de los niveles de progesterona y como consecuencia la hipófisis anterior incrementa la liberación de la hormona folículo estimulante (FSH) que nos da como consecuencia la maduración del folículo, la aparición del estro así como la ovulación.

PERÍODO DE RETIRO

Tiempo de retiro en carne 12 horas

ADVERTENCIAS

Evitar la administración de Porciprost t a los animales gestantes al menos que se desee el aborto

Evitar el manejo de Porciprost por mujeres en edades fértiles o gestantes.

Los animales tratados no podrán ser destinados al consumo humano antes de 12 horas .

Personas asmáticas y mujeres embarazadas deberán de abstenerse de utilizar este producto.

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

PRECAUCIONES

Manténgase en un lugar fresco.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Porciprost debe de ser empleado bajo control Médico Veterinario.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 4 °C y 30 °C y protegido de la luz.

PRESENTACIONES

Fascos de 20 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA

PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO

