



Aves

Primecin® Soluble

Solución soluble de ciprofloxacina al 7.5 % de administración oral.

REG. SAGARPA Q-2083-049

FORMULA

Cada mL contiene:	
Ciprofloxacina (Como	75 mg.
Ciprofloxacina Clorhidrato)	
Vehículo c.b.p.	1 mL.

INDICACIONES

Por su amplio espectro Primecin® Soluble está indicado en aves para la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas, septicémicas y genito - urinarias causadas por bacterias Gram +, Gram - y Mycoplasmas, tales como *Pasteurella spp*, *E. coli*, *Salmonella spp*, *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Pseudomona spp*, *Corynebacterium spp* y *Mycoplasma spp*.

MODO DE ACCIÓN

El efecto bactericida de Primecin® Soluble se basa en su capacidad de inhibir la acción enzimática de las topoisomerasas, que actúan sobre el DNA microbiano:

Primecin® Soluble tiene una acción bactericida rápida al inhibir la DNA girasa (topoisomerasa II) que es la enzima responsable del súper enrollamiento del DNA, así como de la transcripción y la replicación celular, provocando así un efecto letal sobre el DNA microbiano.

Primecin® Soluble actúa rápidamente tanto en la fase de reposo como en la multiplicación (inhibición de la girasa bacteriana), mientras que otros antibióticos, solo actúan en el periodo de multiplicación.

ESPECIES PARA LAS QUE SE RECOMIENDA EL PRODUCTO

Aves.



DOSIS

15 mg de Ciprofloxacina por kg de peso. Equivalente a cada 450 mL de Primecin® Soluble para medicar 2250 kg de peso vivo (1 mL por litro de agua).

La medicación deberá ser de 3 a 5 días seguidos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS

No debe usarse este producto 5 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

No consumir huevo de aves hasta 5 días después del último tratamiento.

Manténgase fuera del alcance de los niños Almacénese a la sombra y en un lugar fresco.

PRESENTACIONES

1 y 20 Litros.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

