



Bovinos

Bovimune Single Shot

REG. SAGARPA B-2083-019

FÓRMULA:

Contiene cultivos completos de *Pasteurella (Mannheimia) haemolytica* serotipos A1, A2 y sus toxoides, *Pasteurella multocida* serotipo A1, *Haemophilus somnus (Histophilus somni)* y *Salmonella dublín*, químicamente inactivados y adsorbidos en hidróxido de aluminio.

INDICACIONES:

Bovimune® Single Shot es una bacterina para la prevención de las enfermedades causadas por *Pasteurella (Mannheimia) haemolytica* serotipos A1, A2 y sus toxinas, *Pasteurella multocida* serotipo A1, *Haemophilus somnus (Histophilus somni)* y *Salmonella dublín* en bovinos, ovinos y caprinos sanos, caracterizadas por neumonías, meningoencefalitis tromboembólica y abortos, contra *Salmonella dublín* enfermedad caracterizada por septicemia y enteritis subaguda, aguda ó crónica.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Bovinos: 5 mL

Ovinos, Caprinos: 2.5 mL

Administrar una sola dosis a animales sanos a partir de 45 días de edad. Es recomendable aplicar una sola dosis 14 días antes del transporte ó situaciones de estrés. Aún cuando se requiere una sola dosis para conseguir la protección ó inmunidad activa, buenas prácticas de manejo apoyan y sugieren la revacunación a los 14 días, bajo el criterio del Médico Veterinario. Administrar por vía subcutánea o intramuscular profunda.

ADVERTENCIAS:

Agítese bien antes de usarse.

Una vez abierto el envase utilice el contenido completamente.

Mantener en refrigeración a una temperatura entre 2 ° y 7 °C, no congelar.



Cualquier biológico puede causar reacciones anafilácticas. En tal caso se recomienda el uso de Sulfato de Atropina seguida de terapia de soporte apropiada.

Este producto ha demostrado ser eficaz en animales sanos a partir de 45 días de edad. Puede no producirse una respuesta inmune protectora si los animales están incubando una enfermedad infecciosa, inmunodeprimidos, mal nutridos, parasitados ó estresados debido a transporte o por condiciones ambientales adversas, o si la vacuna no es administrada de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

Desechar el envase en forma segura, entiérrese o incinérrese

PRESENTACIONES:

Frasco con 10 y 50 dosis.

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.