



Bovinos

TICOFF®

Garrapaticida y mosquicida para ganado

REG. RACO INAC 111-12-2083-001

FORMULA:

Composición porcentual	% En peso
Cipermetrina: 2 ciano-3 Fenoxibencil, Trans 3-(2, 2 diclorovinil -3,2) ciclo Propano carboxilato. (Equivalente a 200 g de i.a./L a 20°C)	
No menos de:	20.00%
Ingredientes inertes:	
Emulsionante, solvente	No más de: 80.00 %
TOTAL:	100.00%

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

La Cipermetrina es un piretroide sintético usado como insecticida para el control de infinidad de plagas, directamente sobre los animales o sobre los cultivos, incluyendo polillas del algodón, frutas, y cosecha de vegetales. también es usado en grietas y hendiduras superficies para el control de insectos en tiendas, almacenes, industrias, casas, apartamentos, viveros, laboratorios, barcos, trenes, autobuses, camiones, y aviones. Se puede utilizar también en escuelas (excepto áreas de alimentación) hospitales, hoteles, plantas procesadores de alimentos y como tratamiento de barrera repelente en caballos.

Al aplicarse sobre los animales se absorbe por piel en baja proporción (1% en 24 horas en ratas), aunque su detoxificación es muy rápida y no se acumula en los tejidos del animal ni en el medio ambiente a diferencia de los pesticidas. Se metaboliza rápidamente en el hígado por reacciones de hidrólisis y oxidación

USO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE

Ticoff actúa sobre todos los estadios de las garrapatas de uno o varios hospederos con una excelente eficacia y prolongado efecto residual (10-14 días). Ticoff también controla otros parásitos externos que afectan al ganado causando irritación, dolor, y molestias, tales como: mosca del establo, mosca de la paleta, mosca de la cara, así como tábanos, piojos y ácaros.



DOSIFICACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Baño de inmersión:

Carga:

Cubar el volumen del baño, utilice 1 litro de Ticoff por cada 1000 litros de agua. Mezcle previamente la cantidad necesaria de Ticoff en una cantidad igual de agua y agregue esta mezcla al agua del baño de inmersión.

Recarga:

Agregue 1.5 litros por cada 1000 litros de agua.

Baño de aspersión:

Prepare una mezcla con 1.5 mL de Ticoff con 1 litro de agua y asperje con gota fina a todo el animal.

Instalaciones:

Aplicar 3 mL de Ticoff por litro de agua.

PERIODO DE RETIRO

Baños de inmersión:

Animales de carne: 3 días

Leche: 6 horas





Bovinos

PRECAUCIONES

Producto moderadamente tóxico. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casa habitación. No deben exponerse ni manejar este producto mujeres embarazadas, en lactación y menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase y entiérrese.

PRESENTACIONES

30, 100 mL, 1 L.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

