



# Aves

## TRAK

Insecticida y/o acaricida de uso externo suspensión para baño por inmersión y aspersión.

**REG. RSCO-PEC-INAC-0179-315-008-013**

### FORMULA:

Composición Porcentual	% EN PESO
Amitraz: N'-(2-4 Dimetil fenil) – N'[[ (2,4-dimetil fenil) imino] metil]-N-metil-metanimidamida (Equivalente a 125 g/L)	12.5%
Ingredientes inertes	87.5%
Total	100%

### INDICACIONES:

TRAK es efectivo para controlar los siguientes ectoparásitos:

- Boophilus annulatus*
- Boophilus microplus*
- Amblyomma habraeum*
- Amblyomma americanum*
- Amblyomma cajennense*
- Amblyomma maculatum*
- Damalinia bovis*
- Haematopinus, spp.*
- Solenoptes capillatus*
- Linognathus vituli*
- Trichodectes canis*
- Linognathus setosus*
- Demodex canis*
- Otodectes cynotis*
- Dermacentor albipictus*
- Rhipicephalus appendiculatus*
- Otobius megnini*
- Sarcoptes, spp.*
- Psoroptes communis*
- Chorioptes bovis*

### INSTRUCCIONES DE USO:

**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**  
**ASPERSIÓN CONTRA GARRAPATAS EN BOVINOS**

TRAK debe diluirse en una proporción de 20 mL. Por cada 10 lts. de agua.  
Utilizar por lo menos 4 litros de la solución preparada para un bovino de aproximadamente 300 kg.



### ASPERSIÓN CONTRA SARNA Y PIOJOS EN CERDOS

TRAK debe diluirse en una proporción de 40 mL. Por cada 10 lts. de agua.  
Utilizar por lo menos 2 litros de la solución preparada para un cerdo de aproximadamente 100 kg.  
Hacer dos tratamientos con intervalos de 7 - 10 días entre el primero y el segundo

### ASPERSIÓN EN INSTALACIONES

TRAK debe utilizarse en una proporción de 80 ml. Por cada 10 lts. de agua

### INMERSIÓN CONTRA GARRAPATAS EN BOVINOS

Carga: Añadir 1.6 lts. de TRAK y 6 kg. De estabilizador de baño simultáneamente por cada 1000 litros de agua.  
Recarga: Para reajustar el nivel del baño se deberá añadir 3.2 litros de TRAK y 12 kg. de estabilizador de baño simultáneamente por cada 1000 litros de agua.



# Aves

**NOTA:** Cuando el baño cargado con TRAK no se esta empleando, agregar 6 kg. de estabilizador por cada 1000 litros de agua cada dos meses. Se recomienda hacer una premezcla previa en una cubeta o pileta premezcladora de TRAK y agua así como del conservador antes de añadir el producto al baño. Como evitar la formación de grumos del conservador en el baño. Debe determinarse el pH del baño después de agregar el conservador. El pH debe de ser de 12 – 15. Si no es así, debe agregar más conservador.

Para el control de la garrapata de uno o varios huéspedes deberá efectuarse el tratamiento estratégico dependiendo del grado de infestación, especie de garrapata y localización geográfica de los animales.

TRAK puede usarse en bovino, ovinos, caprinos, cerdos y perros, excepto razas miniaturas y cachorros menores a tres meses de edad. TRAK no debe usarse en caballos.

La carne de animales tratados con TRAK puede ser consumida 24 hrs después de haber iniciado el tratamiento.

La leche obtenida de animales tratados con TRAK puede ser consumida el mismo día del tratamiento.

## ADVERTENCIAS:

No se recomienda su uso en equinos

No almacenarse junto al alimento.

No se deje al alcance de los niños

Evite desechar los envases en tanques, vías de agua y zanjas, ya que es nocivo para los organismos acuáticos.

TRAK puede usarse en bovino, ovinos, caprinos, cerdos y perros, excepto razas miniaturas y cachorros menores a tres meses de edad

## PRESENTACIONES:

100 mL, 1 y 8L.

## CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

