



Ovinos

TRAK

Insecticida y/o acaricida de uso externo suspensión para baño por inmersión y aspersion.

REG. RSCO-PEC-INAC-0179-315-008-013

FORMULA:

| Composición Porcentual | % EN PESO |
|--|-----------|
| Amitraz: N'-(2-4 Dimetil fenil) – N'-[[[(2,4-dimetil fenil) imino] metil]-N-metil-metanimidamida (Equivalente a 125 g/L) | 12.5% |
| Ingredientes inertes | 87.5% |
| Total | 100% |

INSTRUCCIONES DE USO:

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Dilución:

Para baño por aspersion:

TRAK debe utilizarse en una proporción de 80 mL. Por cada 10 Lts. de agua.

Para baño de inmersión:

Anadir 320 mL de TRAK en un tambo de 200 litros de agua, más 1.2 kg de estabilizador de baño.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

En la dilución indicada, en baño de inmersión o por aspersion.

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Para casos de incidencia de parasitosis por garrapatas es muy alta, aplicar:

A todos los vientres, sementales y reemplazos.

Cada 4 meses, en aquellos lugares donde la infestación es permanente todo el año. Y en aquellos lugares donde la presencia de alta humedad es estacional, aplicar al principio y al final de la época de lluvias.

NOTA: Para el caso de corderos y para aquellos lugares donde el clima es frío, el control se recomienda con productos como Dectiver Premium.

ADVERTENCIAS:

No se recomienda su uso en equinos

No almacenarse junto al alimento.

No se deje al alcance de los niños

Evite desechar los envases en tanques, vías de agua y zanjas, ya que es nocivo para los organismos acuáticos.



TRAK puede usarse en ovinos, y caprinos

Se puede usar para control de ectoparásitos como garrapatas piojos y ácaros. Existe también la opción de usar Dectiver Premium inyectable.

En casos de presencia de piojos mordedores, solo existen dos opciones para su tratamiento: baños de aspersion (TRAK) o aplicación epicutánea con Lomo Pon S.

PRESENTACIONES:

100 mL, 1 y 8L.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

