

PROVIDEAN VIRATEC 10 CV 4L

Vacuna contra Distemper, Parvovirus, Hepatitis, Enfermedad Respiratoria (por *Adenovirus tipo II*), Parainfluenza, Coronavirus y Leptospirosis de los Caninos

REG. SAGARPA B-2083-029

USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuados (DICC 50%/ dosis):

Parvovirus canino ($\geq 10^{6,5}$), Distemper ($\geq 10^3$), Adenovirus canino Tipo II ($\geq 10^{2,5}$), Parainfluenza canina ($\geq 10^5$). Virus inactivado de Coronavirus canino ($\geq 10^5$ DICC50%/dosis)

Bacterina de *Leptospira interrogans* serovar *icterohaemorrhagiae* ($\geq 10^7$ Bacterias/ dosis), *Leptospira interrogans* serovar *canicola* ($\geq 10^7$ Bacterias/ dosis) *Leptospira interrogans* serovar *Pomona* ($\geq 10^7$ Bacterias/ dosis), y *Leptospira interrogans* serovar *grippotyphosa* ($\geq 10^7$ Bacterias/ dosis).

INDICACIONES:

Se recomienda la vacunación de perros en buen estado de salud general, con correcto desarrollo nutricional, desparasitados, sin estado febril y fuera de cuadros de estrés por condiciones adversas del entorno.

Primovacunación: En cachorros a partir de las 6 semanas de vida aplicar un programa de vacunación de tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 semanas en cada una de ellas. Es aconsejable haber terminado el programa de vacunación antes de las 12 semanas de vida para inducir el periodo de ventana de exposición de los cachorros durante su fase de sociabilización.

Revacunación: Aplicar una dosis de refuerzo todos los años.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Caninos: 1 mL



Mediante aguja y jeringa estéril, extraer asépticamente la fracción diluyente y reconstituir la fracción liofilizada. Agitar hasta obtener una solución homogénea. Administrar 1 mL en forma intramuscular o subcutánea.

ADVERTENCIAS:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. Evitar la vacunación de hembras gestantes. Todas las vacunas pueden provocar reacciones de tipo anafilácticas, en tal caso aplicar corticoesteroide.

PRESENTACIONES:

10 frascos 1 dosis liofilizada cada uno
10 frascos con diluyente

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Hecho en Argentina por:

Tecnovax S.A, Luis Viale 2835 (C1416DNU) Ciudad Autónoma de Bs. As, Argentina.

SENASA: Certificado N° 06-147. Est. Elaborador N° 8520.

Tel./Fax: (+54) (11) 4585-9695 /4899-0568.

www.tecnovax.com

D.T (Director Científico): Dra. Marcela Iglesias M.P 7140.