

Volvac[®] Influenza FP RECOMBINANTE

Virus recombinante de Viruela + Influenza Aviar / Recombinant Fowl
Pox virus + Avian Influenza

REGISTRO SAGARPA B-2083-039

USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada mL contiene un título mínimo de 10^{4.0} DIEP50.

DESCRIPCIÓN:

Virus recombinante de Viruela Aviar, cepa FPV 402/HA 10p8, que expresa la hemaglutinina H5 del virus de Influenza Aviar. Originada en embriones de pollo SPF (Libres de Patógenos Específicos).

Lea con atención y siga las indicaciones cuidadosamente antes de aplicar la vacuna.

PRESENTACIONES:

5 x 4,000 dosis.

Frascos de vidrio con virus liofilizado y sellado al alto vacío.

INDICACIONES:

Volvac[®] Influenza FP Recombinante, puede ser administrada en pollos, pollas de reemplazo, de ponedoras y reproductoras sanas como auxiliar en el control y prevención de la Influenza Aviar (AI).

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Las aves se deben vacunar al día de edad.

El uso de este biológico está restringido a aquellas zonas autorizadas por la SAGARPA.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar 0.1 mL o 0.2 mL por vía subcutánea.

PREPARACIÓN DE LA VACUNA:

Para mantener la máxima potencia de la vacuna, el virus no debe ser mezclado con el diluyente hasta unos minutos antes de su aplicación.

Prepare la vacuna de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1. Quite la retapa de aluminio que cubre el frasco del virus liofilizado.
2. Agregue 40 mL de diluyente.
3. Agite hasta que el virus esté completamente diluido y reconstituido.
4. Una vez reconstituida la vacuna con los 40 mL de diluyente, se tienen 2 opciones:
 - 1) Diluir los 40 mL de la vacuna reconstituida con 760 mL de diluyente para tener un volumen total de 800 mL y aplicar 0.2 mL por ave.
 - 2) Diluir los 40 mL de la vacuna reconstituida con 360 mL de diluyente para tener un volumen total de 400 mL y aplicar 0.1 mL por ave.

PRECAUCIONES:

1. La técnica apropiada de vacunación debe asegurar la inmunización completa de la parvada.
2. El uso de esta vacuna es exclusivamente como primera vacunación de Influenza Aviar.
3. Establezca su programa de vacunación de acuerdo a la frecuencia de los brotes de la enfermedad en su región y a las necesidades estacionales de sus aves.
4. La reacción inmunológica o protección de las aves con la vacuna, depende en gran parte de observar cuidadosamente las instrucciones indicadas.
5. Después de utilizar la vacuna destruya el envase y el contenido no usado.
6. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
7. No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio de los animales destinados al consumo humano.



NOTA: Este lote de **Volvac[®] Influenza FP Recombinante** vacuna contra la Influenza Aviar, antes de salir a la venta ha sido sometida a pruebas rigurosas de pureza, seguridad, potencia e inmunidad, de acuerdo a las normas, requerimientos y reglamentos gubernamentales. No nos hacemos responsables por el mal manejo o el uso inadecuado del producto.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Hecho en México para:
LAPISA, S.A. DE C.V.
Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5,
Col. Camelinas, C.P. 59375,
La Piedad, Michoacán, México.
Tel +52 (352) 526-13-00
www.lapisa.com