

DORSO-PET® GUARD SPOT ON

ECTOPARASITICIDA PARA USO EN PERROS Y GATOS

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-198

USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Fipronil 97 mg
Vehículo c.b.p. 1 mL

INDICACIONES:

Dorso-Pet® Guard Spot On es un tratamiento para la prevención y control de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides spp.* y *Pulex irritans*), piojos (*Linognathus setosus*, *Heterodoxus spiniger* y *Trichodectes canis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes scapularis*, *Amblyomma spp.* y *Haemaphysalis spp.*) en perros y gatos.

Dorso-Pet® Guard Spot On elimina las pulgas de los animales tratados, por lo que puede ser utilizado para el tratamiento de la Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAP).

ESPECIE:

Perros y gatos.

DOSIS:

Dorso-Pet® Guard Spot On son pipetas de dosis única, cada pipeta contiene la dosis mínima recomendada de 6.7 mg/kg de Fipronil, aplicar 1 pipeta por animal dependiendo del peso:

Perros de 1 a 10 kg: 1 pipeta con 0.67 mL.

Perros de 11 a 20 kg: 1 pipeta con 1.34 mL.

Perros de 21 a 40 kg: 1 pipeta con 2.68 mL.

Perros de más de 40 kg: 1 pipeta con 4.02 mL.

Para perros con más de 60 kg utilice una pipeta de 4.02 mL más una pipeta pequeña para obtener la dosis correcta, según el peso del animal.

Gatos: 1 pipeta con 0.5 mL.

No bañar al perro o al gato dos días antes ni después de la aplicación de **Dorso-Pet® Guard Spot On**.

Dorso-Pet® Guard Spot On se puede aplicar en cachorros a partir de 8 semanas de edad, así como en hembras preñadas y lactantes.

Dorso-Pet® Guard Spot On se puede aplicar en gatitos a partir de 8 semanas de edad, así como en hembras preñadas y lactantes.

Administrado aproximadamente cada 4 semanas durante la temporada de pulgas ofrece un control suficiente de las mismas y evita que se multipliquen las poblaciones. Para el tratamiento y control de dermatitis alérgica por piquete de pulga (DAP), se recomiendan aplicaciones mensuales en animales alérgicos y otros perros que convivan con ellos.

Aplicar una pipeta cada 1 o 3 meses dependiendo del grado de infestación tanto de Pulgas como Piojos o Garrapatas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica (Spot On). Aplicar el contenido total de la pipeta sobre la piel a la altura de la cruz del animal.

PRESENTACIÓN:

1 pipeta con 0.67 mL:

1 pipeta con 1.34 mL:

1 pipeta con 2.68 mL:

1 pipeta con 4.02 mL:

1 pipeta con 0.5 mL:

Perros con peso de 1 a 10 kg

Perros con peso de 11 a 20 kg

Perros con peso de 21 a 40 kg

Perros con peso superior a 40 kg

Para gatos

MECANISMO DE ACCIÓN:

Dorso-Pet® Guard Spot On está compuesto por Fipronil que es un insecticida y acaricida fenilpirazólico altamente eficaz, actúa mediante el bloqueo pre y post-sináptico del pasaje de los iones de cloro a través de los neurotransmisores GABA, provoca así una hiperexcitación, actividad incontrolada del sistema nervioso central y la muerte de los insectos. Fipronil posee afinidad por la grasa presente en la superficie de la piel y en los folículos pilosos, siendo liberado de forma continua con la secreción sebácea sobre la piel y pelo de los animales, confiriendo a **Dorso-Pet® Guard Spot On** larga actividad residual.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO:

El Fipronil no tiene un antídoto específico; proceder a tratamientos de apoyo según los síntomas presentes. En caso de intoxicación por ingestión proceder a un lavado del estómago, administrar carbón activo y laxantes.

En caso de intoxicación por vía dermal, bañar el animal con un champú no insecticida.

PRECAUCIONES:

Asegúrese de que los animales no se lamen unos a otros después del tratamiento. En caso de lamido, puede observarse un breve periodo de hipersalivación. Este producto puede causar irritación ocular y de la mucosa, por lo que deberá evitarse el contacto del producto con la boca y con los ojos. Se han reportado reacciones adversas después de aplicado el medicamento, las cuales pueden ser: reacciones cutáneas transitorias, eritema, prurito o alopecia. Excepcionalmente, se ha observado hipersalivación, signos neurológicos reversibles (hiperestesia, letargia, síntomas nerviosos, ataxia), vómitos o signos respiratorios. Este producto puede administrarse a hembras gestantes y en lactación.

ADVERTENCIAS:

Para uso externo veterinario.

No exceder la dosis recomendada.

No utilizar en animales enfermos o convalecientes.

No utilizar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Puede causar ligera irritación en la piel y ojos. Evite el contacto.

Como para todos los insecticidas de su clase: no se transporte y almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar, a una temperatura entre 15 y 30 °C.

El Fipronil puede afectar adversamente a algunos organismos acuáticos. No contaminar estanques, ríos o arroyos con el medicamento.

Los recipientes vacíos, así como cualquier contenido residual deben desecharse de acuerdo a la normatividad vigente / Eliminar los envases en el centro de acopio más cercano.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Hecho en México por:

LAPISA, S.A. de C.V.

Carr. La Piedad-Guadalajara km 5.5,

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

www.lapisa.com

