

Coxizuril 5%

SUSPENSIÓN ORAL
NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-155
USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Toltrazuril 50 mg
Vehículo c.b.p. 1 mL

INDICACIONES:

Coccidicida.

Está indicado para el tratamiento de coccidiosis en:

Perros: *Cystoisospora canis*, *Cystoisospora ohioensis*, *Hammondia heydorni*. Es efectivo en la reducción de parasitemia e inclusive en la cura de los animales enfermos con *Hepatozoon canis*. Otros protozoarios susceptibles: *Toxoplasma gondii*, *Neospora caninum*, *Sarcocystis ovicanis*.

Gatos: *Cystoisospora felis*, *Hammondia heydorni*.

MODO DE ACCIÓN:

Toltrazuril induce cambios durante la etapa del desarrollo intracelular de los protozoarios, debido principalmente a la vacuolización del retículo endoplasmático, disminuyendo la división nuclear.

Coxizuril 5% actúa contra todas las etapas del desarrollo de protozoarios, interfiere la división del núcleo del protozoario, afecta la actividad de las mitocondrias y daña a los corpúsculos que forman la pared en los microgametos.

Por todo ello, **Coxizuril 5%** es un coccidicida eficaz y que destruye los parásitos en las diferentes etapas de su desarrollo.

DOSIS:

Perros y gatos: 20 mg de Toltrazuril por kg de peso corporal, equivalente de 1 mL de **Coxizuril 5%** por cada 2.5 kg de peso corporal.

Una vez al día por 3 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

ADVERTENCIAS:

Agite bien el producto antes de usarlo. Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz a una temperatura entre 15 y 30 °C.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Deséchese los envases en el centro de acopio más cercano.

PRESENTACIONES:

25, 50, 100, 250, 500 mL y 1L.

Consulte al médico veterinario.
Su venta requiere receta médica.

Hecho en México por:

LAPISA, S.A. de C.V.
Carr. La Piedad-Guadalajara km 5.5,
Col. Camelinas, C.P. 59375,
La Piedad, Michoacán, México.
www.lapisa.com

