

Kaneozol®

SUSPENSIÓN ORAL
NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-025
USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:	
Sulfato de Neomicina	154 mg
Sulfaguanidina	6,600 mg
Sulfatiazol sódico	400 mg
Caolín coloidal	10 g
Atapulguita activada	9 g
Hidróxido de aluminio	6 g
Pectina cítrica	200 mg
Edulcorante	150 mg
Vehículo c.b.p.	100 mL

INDICACIONES:

Antidiarreico.

Indicado en el tratamiento de diarreas y enteritis bacterianas susceptibles a la acción de la fórmula en perros y gatos.

DOSIS:

Perros y gatos: 2 – 10 mL (equivalente de 3.08 a 15.4 mg de sulfato de neomicina, de 132 a 660 mg de sulfaguanidina y 8 a 40 mg de sulfatiazol sódico).

El producto solo deberá ser administrado bajo estricta supervisión del médico veterinario quien indicará el régimen de tratamiento de acuerdo al cuadro clínico infeccioso. El uso del producto Kaneozol® no debe ser prolongado, si la diarrea persiste por más de 2 días deberá suspender el tratamiento de forma inmediata.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

ADVERTENCIAS:

El uso fuera de las indicaciones del producto puede causar resistencia antimicrobiana.

Agítese perfectamente antes de usarse.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar, a una temperatura entre 15 y 30 °C.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Eliminar los envases en el centro de acopio más cercano.

PRESENTACIONES:

Frasco con 60 mL.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Material para uso del médico veterinario

Hecho en México por:

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad-Guadalajara km 5.5,

Col. Camelinas, C. P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel +52 (352) 526-13-00

www.lapisa.com

