

PROVIDEAN VIRATEC 10 CV-4L

Vacuna contra Moquillo, Parvovirus, Hepatitis, Enfermedades Respiratorias,
Coronaviriosis y Leptospirosis de los caninos.

NÚMERO DE REGISTRO B-2083-028
USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuados (DICT_{50%}/dosis):
Distemper Canino ($\geq 10^4$), Parvovirus Canino ($\geq 10^{6.5}$), Adenovirus Canino Tipo 2 ($\geq 10^3$), Parainfluenza Canina ($\geq 10^5$), Coronavirus canino inactivado ($\geq 10^5$ DICT_{50%}/dosis) y bacterinas por dosis (bacterinas/dosis) de *Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae* ($\geq 10^7$), *Leptospira interrogans serovar canicola* ($\geq 10^7$), *Leptospira interrogans serovar pomona* ($\geq 10^7$), *Leptospira kirschneri serovar grippotyphosa* ($\geq 10^7$).

FORMA DE USO Y ADMINISTRACIÓN:

Se recomienda la vacunación de perros en buen estado de salud general, con correcto desarrollo nutricional, desparasitados, sin estado febril y fuera de cuadros de estrés por condiciones adversas del entorno.

PLAN DE VACUNACIÓN SUGERIDA:

En cachorros a partir de las 6 semanas de vida aplicar un programa de vacunación de tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 semanas en cada una de ellas. Evitar el contacto del animal con fuentes potenciales de contagio hasta que se haya completado su esquema de vacunación. Aplicar una dosis de refuerzo todos los años. El plan de vacunación debe ser adaptado a criterio del Médico Veterinario de acuerdo a las condiciones específicas de cada animal, región y/o entorno.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Caninos: 1 mL.

Mediante aguja y jeringa estéril extraer asépticamente el diluyente y reconstituir la fracción liofilizada. Agitar hasta obtener una solución homogénea. Administrar 1 mL por vía intramuscular o subcutánea.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8°C. No congelar.

Proteger de la luz solar.

Usar todo el contenido inmediatamente después de rehidratar.

Utilizar agujas y jeringas desechables estériles para su aplicación.

Reconstituir la fracción liofilizada exclusivamente con el diluyente suministrado junto a Providean Viratec 10 CV-4L, ya que otros diluyentes podrían, eventualmente, inactivar la vacuna reduciendo así su eficacia.

Evitar la utilización de desinfectantes para la limpieza de agujas ya que los mismos pueden inactivar la vacuna. Desechar el envase en forma segura, entiérrese o incinérese.

Evitar la vacunación de hembras gestantes.

En el caso de producirse reacciones de tipo anafilácticas o de hipersensibilidad post vacunación, el Médico Veterinario debe administrar el tratamiento específico.

Mediante pruebas controladas de laboratorio, se ha demostrado que este producto cumple con las normas de seguridad y eficacia para inmunizar animales sanos. Dicho rendimiento puede verse afectado por condiciones propias del individuo, que deben ser tenidas en cuenta por el Médico Veterinario, en forma previa a la inmunización.

PRESENTACIONES:

10 frascos de 1 dosis liofilizada, 10 frascos de 1 mL de diluyente.

25 frascos de 1 dosis liofilizada, 25 frascos de 1 mL de diluyente.

Venta bajo receta medica.

Consulte al médico veterinario.

Elaborado por:

TECNOVAX S.A.

Establecimiento elaborador N°8520

Luis Viale N° 2835, C1416DNU, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, Argentina

Tel: (+54) (11) 4585-9695

www.tecnovax.com

Importado y distribuido por:

LAPISA, S.A. de C.V.

Carr. La Piedad-Guadalajara km 5.5, Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel +52 (352) 526-13-00

www.lapisa.com

