

PROVIDEAN VIRATEC DP

Vacuna contra Moquillo y Parvovirus de los Caninos.

NÚMERO DE REGISTRO B-2083-041

USO VETERINARIO

FÓRMULA/COMPOSICIÓN:

Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene virus atenuados (DICT_{50%}):
Dístemper Canino ($\geq 10^5$), Parvovirus Canino ($\geq 10^7$)

FORMA DE USO Y ADMINISTRACIÓN:

Se recomienda la vacunación de animales en buen estado de salud y nutricional, libres de parásitos y normotérmicos. Evitar en lo posible situaciones de estrés producidas por condiciones adversas del entorno. Mediante jeringa y aguja estéril extraer asepticamente el contenido del diluyente provisto con la vacuna y reconstituir la fracción liofilizada. Agitar suavemente hasta obtener una suspensión homogénea.

Administrar 0.5 mL por vía subcutánea o intramuscular.

PLAN DE VACUNACIÓN SUGERIDO:

Providean[®] Viratec DP es una vacuna con alto título viral, indicada para el comienzo de la vacunación en cachorros jóvenes, a partir de las 4 a 6 semanas de vida. Aplicar un programa de vacunación con un mínimo de tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 a 4 semanas entre cada una de ellas. Si la última dosis del programa fue aplicada antes de las 16 semanas de vida, se recomienda administrar una dosis adicional debido a que los anticuerpos maternos pueden interferir en un adecuado desarrollo de la respuesta inmune del cachorro. Revacunación: Se recomienda la revacunación anual. El programa de vacunación debe ser adaptado por el Médico Veterinario de acuerdo a las necesidades de cada individuo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Uso veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto accidental con el producto comuníquese de inmediato con el Centro Nacional de Intoxicaciones, (En Argentina- Tel: 0800-333-0160). Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8°C. No congelar. Usar todo el contenido inmediatamente después de rehidratar. Utilizar jeringas descartables estériles para su aplicación. Evitar la vacunación de hembras gestantes. Todas las vacunas pueden generar reacciones de hipersensibilidad. En tal caso el Médico Veterinario deberá administrar el tratamiento específico. Mediante pruebas controladas de laboratorio, se ha demostrado que este producto cumple con las normas de seguridad y eficacia para inmunizar animales sanos. Esto puede verse afectado por condiciones propias del individuo. Se recomienda evitar el contacto con fuentes contaminadas hasta que se haya completado el esquema básico de vacunaciones.

PRESENTACIONES:

10 frascos de 1 dosis liofilizada, 10 frascos de 0.5 mL de diluyente.
25 frascos de 1 dosis liofilizada, 25 frascos de 0.5 mL de diluyente.

Venta bajo receta medica.

Consulte al médico veterinario.

Elaborado por:

TECNOVAX S.A.
Establecimiento elaborador N°8520
Luis Viale N° 2835, C1416DNU, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54) (11) 4585-9695
www.tecnovax.com

Importado y distribuido por:

LAPISA, S.A. de C.V.
Carr. La Piedad-Guadalajara km 5.5, Col. Camelinas, C.P. 59375, La Piedad, Michoacán, México.
Tel +52 (352) 526-13-00
www.lapisa.com



Material para el uso del médico veterinario.