

LAPI-RACTO

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-158
PROMOTOR DE CRECIMIENTO EN PREMEZCLA
USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada kg contiene:
Clorhidrato de ractopamina 24 g
Excipiente c.b.p. 1 kg

INDICACIONES:

LAPI-RACTO[®] es efectivo para aumentar la tasa de ganancia de peso, mejorar la eficiencia alimenticia, incrementar el porcentaje de rendimiento de la canal y de cortes magros en cerdos en finalización que reciben una dieta nutricionalmente balanceada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Adminístrese por vía oral a través del alimento balanceado.

Las dosis recomendadas de **LAPI-RACTO**[®] en el alimento final son:

5 – 10 ppm para aumentar la tasa de ganancia de peso y mejorar la eficiencia alimenticia, aumentar el porcentaje de rendimiento de la canal e incrementar la carne magra.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO:

Todos los cálculos descritos en esta sección están hechos sobre una base de 90% de materia seca.

Para asegurar la distribución homogénea de **LAPI-RACTO**[®], se recomienda preparar una premezcla intermedia antes de mezclar con el alimento final (Cuadro 1).

Cuadro 1

*Preparación de una premezcla intermedia a partir de **LAPI-RACTO**[®] (24 g/kg).*

kg de Premezcla Intermedia 90

kg de **LAPI-RACTO**[®] a mezclar con premezcla intermedia 10

Concentración final de Clorhidrato de Ractopamina en la Premezcla Intermedia (g/kg) 2.4

Luego, mezcle completamente esta premezcla intermedia de **LAPI-RACTO**[®], con el alimento completo para cerdos conteniendo por lo menos 16% de proteína cruda, o que esté suplementado con aminoácidos conteniendo por lo menos 0.8% de lisina total, para obtener un alimento final conteniendo entre 5 a 10 ppm de Clorhidrato de Ractopamina (Cuadro 2).

Cuadro 2

Preparación de alimento final a partir de la Premezcla Intermedia (2.4 g/kg)

kg de Alimento Final a usar para la mezcla 997.5

kg de Premezcla Intermedia para mezclar con el alimento final 2.5

Concentración final de Ractopamina en Alimento Final (g/ton métrica o ppm) 6

INSTRUCCIONES PARA ALIMENTAR A LOS CERDOS:

Proporcionar continuamente en las últimas tres a cuatro semanas de la fase de finalización de los cerdos, siempre y cuando se hayan hecho los ajustes en los niveles nutricionales de la fórmula alimenticia.

PERIODO DE RETIRO:

No es necesario retirar este producto del alimento antes del sacrificio.

PRECAUCIÓN:

No utilizar en animales destinados a la reproducción.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 30 °C.

ADVERTENCIAS:

El ingrediente activo, Clorhidrato de Ractopamina, es un beta agonista – adrenérgico.

Los individuos con enfermedad cardiovascular deben tomar precauciones para evitar la exposición.

Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de mezclado: gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos, lentes para protección de los ojos, guantes y botas de neopreno. Después de la operación de mezclado, descontamine el equipo de protección, báñese y póngase ropa limpia.

Sí ocurriera un contacto accidental con los ojos, enjuagar minuciosamente y de inmediato con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica.

PRESENTACIÓN: 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 50 kg.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA

PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO

