

# TU PRIMER COMPAÑERO

Calidad y Confianza **Lapisa**<sup>®</sup>

CALIDAD  
**40**  
AÑOS  
Y CONFIANZA

*Dorso Pet*<sup>®</sup>

**Guard**<sup>™</sup>  
Spot On

**iiBlindaje para tu mascota,  
bienestar para tu familia!!**



**Lapisa**<sup>®</sup>  
ANIMALES DE COMPAÑÍA



[www.lapisa.com](http://www.lapisa.com)



## Protege a tu familia

### PRINCIPALES ENFERMEDADES ZONÓTICAS TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS

Enfermedad	Agente causal	Nombre común	Síntomas
Ehrliquiosis	<i>Ehrliquia chaffeensis</i> y <i>E. ewingii</i> transmitida por garrapata <i>Rhipicephalus</i>	Tifus canino y Fiebre Hemorrágica canina	Fiebre, adenitis, anemia
Lyme	<i>Borrelia burgdorferi</i>	Borreliosis	Mialgias, cefalea, artritis, etc.
Babesiosis	<i>Babesia bigemina</i>	Babesiosis	Cefaleas, náuseas, vómitos, mialgias y hemólisis
Rickettsiosis	<i>Rickettsia rickettsii</i>	Fiebre manchada de las Montañas Rocosas	Fiebre, signos hemorrágicos, mialgias, artralgias, cefalea, exantema, compromiso pulmonar, hepático y neural.



## Otros productos para el control de parásitos en casa y jardín.

### CONTROL FASES DE VIDA LIBRE

(Pulga, piojo y garrapata en sus diferentes estadíos)

**ticoff**<sup>®</sup>

Reg. RACO INAC 111-12-2083-001

**Cipermetrina 20%**

**DOSIS PARA ASPERSIÓN:** 3 mL/Litro de agua.

**FRECUENCIA:** de 2 a 3 aplicaciones en un intervalo de 7 a 10 días, dependiendo de grado de infestación.

**trak**  
A M I T R A Z

Reg. RSCO-PEC-INAC-0179-315-060-013

**Amitraz 12.5%**

**DOSIS PARA ASPERSIÓN:** 8 mL/Litro de agua

**FRECUENCIA:** de 7 a 10 días dependiendo del grado de infestación.

### ROTACIÓN DEL INSECTICIDA

Para evitar los procesos de resistencia, se recomienda rotar la familia de insecticidas al menos cada 12 meses.

Dorso Pet®

# Guard™

## Spot On

Fipronil 9.7%

SAGARPA Q-2083-198

### FÓRMULA:

Cada mL contiene

Fipronil 97 mg

Vehículo c.b.p. 1 mL

### DESCRIPCIÓN:

Ectoparasiticida contra pulgas, piojos y garrapatas.

### INDICACIONES:

Tratamiento para la prevención y control de las infestaciones por **pulgas** (*Ctenocephalides spp* y *Pulex irritans*), **piojos** (*Linognathus setosus*, *Heterodoxus spiniger*, *Trichodectes canis*) y **garrapatas** (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes scapularis*, *Amblyomma spp* y *Haemaphysalis spp*) en perros y gatos.

No bañar al perro o el gato dos días antes ni después de la aplicación de <sup>Dorso Pet®</sup> **Guard**

<sup>Dorso Pet®</sup> **Guard** se puede aplicar en cachorros a partir de 8 semanas de edad, o en hembras preñadas y lactantes.

Administrado aproximadamente cada 4 semanas durante la temporada de pulgas ofrece un control eficiente de las mismas y evita que se multipliquen las poblaciones. Para el tratamiento y control de Dermatitis Alérgica por piquete de Pulga (DAP), se recomiendan aplicaciones mensuales en animales alérgicos y otros perros que con ellos convivan.

### ESPECIE:

Caninos y felinos.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica (Spot On). Aplicar el contenido total de la pipeta sobre la piel a la altura de la cruz del animal.

### DOSIS:

<sup>Dorso Pet®</sup> **Guard** pipetas de dosis única, cada pipeta contiene la dosis mínima recomendada de 6.7 mg/kg de Fipronil, aplicar 1 pipeta por animal dependiendo del peso:

Perros de **1 a 10 kg**: 1 pipeta de 0.67 mL

Perros de **11 a 20 kg**: 1 pipeta de 1.34 mL

Perros de **21 a 40 kg**: 1 pipeta de 2.68 mL

Gatos: 1 pipeta de 0.5 mL

### USO VETERINARIO

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**

Hecho en México por:

LAPISA, SA DE CV

Km 5.5 Carretera La Piedad-Guadalajara

Col. Camelinas CP. 59375

La Piedad Michoacán, México

[www.lapisa.com](http://www.lapisa.com)

## Mecanismo de acción

<sup>Dorsal Pet™</sup>  
**Guard**  
Spot On está compuesto por Fipronil que es un insecticida y acaricida fenilpirazólico altamente eficaz, actúa en el parásito mediante el bloqueo pre y post-sináptico del pasaje de los iones de cloro a través de los neurotransmisores GABA, provoca así una hiper excitación, actividad incontrolada del sistema nervioso central y la muerte de los insectos. Fipronil posee afinidad por la grasa existente, en la superficie de la piel y en los folículos pilosos siendo liberado de forma continua sobre la piel y pelo de los animales, confiriendo a <sup>Dorsal Pet™</sup>**Guard** Spot On larga actividad residual.



## Pruebas de efectividad en pulgas, piojos y garrapatas

### 18 perros naturalmente infestados

Divididos en 3 grupos de **6 animales** cada uno (con cargas similares de **pulgas**)

<sup>Dorsal Pet™</sup>  
**Grupo 1: Guard**  
Spot On


**Grupo 2:** Fipronil comercial

**Grupo 3:** Testigo (sin tratamiento).


- Elimina 100% de pulgas sobre la mascota durante las primeras 24-48 horas.
- Proporciona una efectividad del 100% durante los primeros 60 días.
- Se concluye que ambos productos ejercen **excelente eficacia contra pulgas y piojos** desde el segundo día, pos tratamiento **manteniendo un alto poder residual durante tres meses** que duró el estudio.



### Resultados prueba en Pulgas




## Método de aplicación



1 Romper la línea punteada de la pipeta.



2 Apartar el pelo hasta observar la piel.



3 Vaciar el contenido de la pipeta en los hombros de la mascota.

realizadas por el departamento de parasitología de la UNAM\*.

### 24 perros naturalmente infestados

Divididos en 3 grupos de 8 animales cada uno (con carga similares de garrapatas)

Grupo 1: Dorsopet **Guard**  
Spot On

Grupo 2: Fipronil comercial.

Grupo 3: Testigo (sin tratamiento)


- Eficacia del 99.4% a los primeros 7 días.
- Control y prevención hasta por 28 días.
- La mayoría de las garrapatas aparecen muertas en el piso a partir del segundo día pos tratamiento.
- Se concluye que ambos productos tienen una **alta eficacia garrapaticida** en perros infestados.

### Resultados prueba en Garrapatas



El estudio demostró que **no existen diferencias significativas** en el resultado de ambos productos ( $P>0.05$ )

\*Ibarra F. et al. 2014, Reporte Final. Eficacia de Dorsopet Guard spot on contra piojos, pulgas, garrapatas en Perros. LAPISA-UNAM.



## Calendario anual de aplicación

- **Bajo riesgo**  
Aplicar una pipeta cada **60 días**
- **Medio riesgo**  
Aplicar una pipeta cada **45 días**
- **Alto riesgo**  
Aplicar una pipeta cada **30 días**

Una pipeta 0.67 mL  
en perros con  
peso de 1 a 10 kg



Una pipeta 1.34 mL  
en perros con  
peso de 11 a 20 kg



Una pipeta 2.68 mL  
en perros con  
peso de 21 a 40 kg



Una pipeta 0.5 mL  
para gatos



Solicítalo a tu Médico Veterinario de confianza.  
No requiere receta médica

De venta en Clínicas y Farmacias veterinarias.  
Fácil y seguro de aplicar.

