

trak

A M I T R A Z



Trak es efectivo para controlar los siguientes ectoparásitos

GARRAPATAS

Rhipicephalus (B.) microplus
Rhipicephalus (B.) annulatus
Amblyomma americanum
Amblyomma cajennense
Amblyomma maculatum
Dermacentor albipictus
Rhipicephalus sanguineus
Otobius megnini

Linognathus vituli

Linognathus setosus

PIOJOS MASTICADORES

Damalinea bovis

ACAROS

Trichodectes canis
Demodex canis
Otodectes cynotis
Sarcoptes spp
Psoroptes spp
Chorioptes bovis

PIOJOS CHUPADORES

Haematopinus spp
Solenopotes capillatus



Inmersión contra garrapatas en bovinos

Carga: Añadir 1,6 litros de **Trak** y 6 Kg de estabilizador de baño simultáneamente por cada 1,000 litros de agua.

Racarga: Para reajustar el nivel de baño se deberá añadir 3 litros de **Trak** y 12 Kg de estabilizador de baño simultáneamente por cada 1,000 litros de agua.

NOTA: Cuando el baño cargado con **Trak** no se está empleando, agregar 6 Kg de estabilizador por cada 1,00 litros de agua cada dos meses. Para evitar la formación de grumos del conservador en el baño; se recomienda hacer una premezcla previa en una cubeta o pileta premezcladora de **Trak** y agua así como el conservador antes de añadir producto al baño. Debe determinarse el pH del baño después de agregar el conservador. El pH debe de ser de 12-14. Si no es así, debe agregar más conservador.

Para el control de la garrapata de uno o varios huéspedes deberá efectuarse el tratamiento estratégico dependiendo del grado de infestación, especie de garrapata y localización geográfica de los animales. **Trak** puede usarse en bovino, ovino, caprino, cerdos y perros, excepto razas miniatura cachorros menores a tres meses de edad. **Trak** no debe usarse en caballos.

Período de retiro

La carne de animales tratados con **Trak** puede ser consumida 24 horas después de realizado el tratamiento.

La leche obtenida de animales tratados con **Trak** puede ser consumida el mismo día del tratamiento.

Fórmula:

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO

% EN PESO

Amitraz: N-(2,4-dimetil fenil-N-[[2,4-dimetil fenil]imino]metil]-N-metil metanimidina

12,5 %

Equivalente a 125 g de I.A/L

Ingredientes inertes

87,5 %

TOTAL

100 %

Instrucciones de uso:

Siempre calibre su equipo de aplicación

Aspersión contra garrapatas en bovinos

Trak debe diluirse en una proporción de 20 mL por cada 10 litros de agua.

Utilizar por lo menos 4 litros de la solución preparada para un bovino de aproximadamente 300 Kg de peso.

Aspersión contra sarna y piojos en cerdos

Trak debe diluirse en una proporción de 40 mL por cada 10 litros de agua.

Utilizar por lo menos 2 litros de la solución preparada para un cerdo de aproximadamente 100 Kg.

Dos tratamientos con intervalo de 7 días entre el primero y el segundo.

Aspersión en instalaciones

Trak debe utilizarse en una proporción de 80 mL por cada 10 litros de agua.

Presentación

Frascos con 100 mL, 1 litro y de 8 litros



USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO