



ticoff®



Reg. RACO INAC-111-12-2083-001

**Garrapaticida-mosquicida para uso
en animales e instalaciones**

¡ EL ALIADO SEGURO Y EFECTIVO !



Lapisa®
SALUD ANIMAL



ticoff®

Reg. RACO INAC-111 -12-2083-001

Garrapaticida-mosquicida de uso externo

Fórmula:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Cipermetrina: 2 ciano-3 Fenoxibencil, Trans 3-(2, 2 diclorovinil -3,2) ciclo Propano carboxilato.....	NO MENOS DE: 20.00 %
Emulsionantes c.b.p.	100.00 %

**¡ EL ALIADO
SEGURO Y EFECTIVO !**

Ventajas

Formulado a base de cipermetrina, es un piretroide sintético de tercera generación usado como insecticida que actúa sobre todos los estadios de las garrapatas de uno *Rhipicephalus (B.) microplus* o varios hospederos con una excelente eficacia y prolongado efecto residual.

Control de garrapatas y moscas en animales: Bovinos, ovinos, caprinos y equinos.

Ticoff® también controla otros parásitos externos que afectan al ganado causando irritación, dolor, y molestias, tales como: mosca brava, mosca de la paleta, mosca domestica, así como tábanos, piojos y ácaros.

Baño de inmersión (bovinos)	Baño de aspersión (bovinos)	Baño de aspersión (cerdos)
Carga: 1 litro de Ticoff® por cada 1,000 litros de agua.	Diluir 1.5 mL de Ticoff® en un litro de agua. Utilizar de 3 a 4 litros para cada animal de 300 kilos de peso.	Diluir 2 mL de Ticoff® en un litro de agua. Utilizar por lo menos 2 litros de la solución preparada para un cerdo de aproximadamente 100 kilos de peso.
Recarga: agregue 1.5 litros de Ticoff® por cada 1,000 litros de agua.		

AGROVET

¡ Reduce las molestias causadas por insectos voladores y picadores !

Uso en instalaciones

Diluir 5 mL de **Ticoff®** por litro de agua para insectos voladores (moscas, mosquitos, palomillas) y diluir 10 mL de **Ticoff®** por litro de agua para insectos rastreros (hormiga, pulga, chinche, escarabajo, araña, cucaracha y alacrán).

De 25 a 50 mL de **Ticoff®** por cada 5 litros de agua es suficiente para asperjar 100 m² de instalaciones. De acuerdo al grado de infestación de moscas a intervalos de 20 a 30 días mediante tratamientos por aspersión.

Detectar y aplicar en los sitios de descanso de la mosca adulta en los siguientes tipos de instalaciones:

- Instalaciones lecheras
- Instalaciones de engorda
- Instalaciones porcícolas
- Instalaciones avícolas
- Instalaciones equinas

Se deben impregnar perfectamente tanto los animales como las instalaciones para asegurar un buen efecto.

Periodo de retiro:

- Animales de carne: 4 días
- Leche: 1 día

Presentación:

Envases de plástico de 30 mL, 100 mL, 1 litro y lata de 5 litros.



USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

LAPISA, S.A. DE C.V.
Km. 5.5 Carr. La Piedad-Guad.
La Piedad, Michoacán, México.
Tel. 01 (352) 52 613 00
www.lapisa.com



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

EMPRESA CON SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

