

Zimacal®

REGISTRO SAGARPA Q-2083-164

Lapisa®
SALUD ANIMAL



www.lapisa.com

Hecho en México por:



Lapisa, SA de CV. Carr. La Piedad-Guadalajara, km. 5.5 Col. Camelinas, C.P. 59375. La Piedad, Michoacán, México. Tel + 52 (352) 526 1300

Zimacal® (Magnesio, calcio, zinc), REGISTRO SAGARPA Q-2083-164. Consulte al Médico Veterinario.

025-SAN-FT-01A



Mineral Inyectable de Acción Prolongada



INDICACIONES

Coadyuvante para la regeneración de la pezuña en casos de gabarro, laminitis, abscesos, úlceras y fisuras plantares.

Coadyuvante para el tratamiento de hipocalcemia, lenta involución uterina y animales débiles post-parto.

Para la prevención y tratamiento de la tetania de los pastos, en potreros con rebrotes verdes luego de lluvias con bajas concentraciones de Magnesio y Zinc.

Tratamiento de desbalances metabólicos por carencias nutricionales de Magnesio y Zinc. Coadyuvante para reducir el periodo de adaptación en animales que ingresan al corral.

USO

Bovinos, ovinos y porcinos.

DOSIS

Bovinos, ovinos y porcinos:

Terapéutica: 7 mL por cada 100 Kg de peso.

Preventiva: 5 mL por cada 100 Kg de peso.

Frecuencia de aplicación:

Terapéutica: cada 10 días hasta remisión de los signos y no más de 3 repeticiones, siguiendo con la dosis preventiva.

Preventiva: Cada 30 días.

FÓRMULA

Cada 100 mL contienen:

Magnesio	987 mg
Calcio	795 mg
Zinc	670 mg
Vehículo c.b.p.	100 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unicamente subcutánea.

ADVERTENCIAS

Con anticipación consulte con el Nutriólogo el aporte total de Zinc, Magnesio y Calcio en la dieta para determinar la dosis y el tiempo a suplementar en forma parenteral.

Tiempo de retiro: 0 días.

Agítese antes de usar.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

No aplicar más de 10 mL por sitio de aplicación.

PRESENTACIONES

Frascos con 500 mL.