

Coccireka 12%

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-140
PREMEZCLA MEDICADA
USO VETERINARIO

INDICACIONES

Premezcla indicada como metafiláctico de coccidiosis aviar causada por *Eimeria acervulina*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria maxima*, *Eimeria mivati*, *Eimeria mitis* y *Eimeria tenella* en Aves (Pollos de engorda y pollitas de reemplazo).

FÓRMULA

Cada kg contiene:
Salinomicina sódica 120 g
Excipiente c.b.p. 1 kg

DOSIS

Administrar diariamente de 500 a 600 g por tonelada de alimento terminado, equivalentes a 60-72 ppm de salinomicina, durante un periodo no mayor a 21 días. La duración y frecuencia del tratamiento puede variar, considerando el nivel de infestación de la parvada. El uso de este producto es bajo prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, mezclado con el alimento terminado.

PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg.

PERIODO DE RETIRO

No requiere periodo de retiro.

ADVERTENCIAS

No utilizar el producto en especies distintas a las indicadas, en pavos y equinos es tóxico.

No utilizar este producto simultáneamente con tiamulina o troleandomicina.

No administrar este producto 7 días antes de que las aves rompan postura.

No administrar este producto en aves productoras de huevo para consumo humano.

No requiere periodo de retiro para aves de engorda ni pollitas de reemplazo.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA