

directo
contigo

Lapisa[®]
AGRÍCOLA
¡Cosechando resultados!





CONTROL[®]

FUNGICIDA





Control y **protección**
de la **cenicilla** en un, dos por tres.






Preventivo y curativo para la cenicilla.

RESULTADOS





Estudio de evaluación de efectividad biológica del fungicida Control XLP® 40 PH para el control de la cenicilla (*Erysiphe cichoracearum*) en el cultivo de pepino, en Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Dr. Mario A. Franco S y Dr. A. Margarito García M. abril 2018.




Estudio de evaluación de efectividad biológica del fungicida Control XLP® 40 PH para el control de la cenicilla (*Uncinula necator*) en el cultivo de vid, en Empalme, Sonora.

Dr. Mario A. Franco S y Dr. A. Margarito García M. abril 2018.



Estudio de evaluación de efectividad biológica del fungicida Control XLP® 40 PH para el control de la cenicilla (*Leveillula taurica*), en el cultivo de tomate en el Fuerte, Sinaloa.

Dr. Mario A. Franco S y Dr. A. Margarito García M. abril 2018.



Estudio de evaluación de efectividad biológica del fungicida Control XLP® 40 PH para el control de la cenicilla polvorienta (*Sphaerotheca macularis*), en el cultivo de zarzamora, en Jacona, Michoacán.

Dr. Mario A. Franco S y Dr. A. Margarito García M. abril 2018.

**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ
RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Ajo, Cebolla, Cebollín, Espárrago, Poro (3)	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	228-342 g/ha Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad.
Pepino, Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Sandía (SL)	Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) Tizón foliar (<i>Alternaria cucumerina</i>)	114-228 g/ha Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se presenten las condiciones ideales para el desarrollo de la enfermedad.
Berenjena, Chile, Jitomate, Okra, Papa, Pimiento morrón, Tomate verde (1)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	114-250 g/ha Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad.
Crisantemo (0)	Roya blanca (<i>Puccinia horiana</i>)	20-50 g/100 L de agua Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y cuando se presenten las condiciones ideales para el desarrollo de la enfermedad.
Vid (14)	Cenicilla (<i>Uncinula necator</i>)	114-250 g/ha Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y cuando se presenten las condiciones ideales para el desarrollo de la enfermedad.
Manzano (14)	Cenicilla (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	12 – 20 g/100L de agua Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad.
Zarzamora, Arandano, Frambuesa, Fresa, Grosella (SL)	Cenicilla polvorienta (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	228-250 g/ha Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad.

() Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite.

FORMULADO POR:

Lapisa
AGRICOLA
¡Cosechando resultados!

GARANTÍA; LAPISA S.A. DE C.V., Garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ellos se pudiesen ocasionar.

LAPISA, S.A. DE C.V.
Carr. La Piedad – Guadalajara Km. 5.5,
Col. Camelinas, C.P. 59375,
La Piedad, Michoacán, México.
www.lapisa.com

(352) 526 1300 Ext. 607, 609

